

وزارة التربية والتعليم العالي
امتحانات كولوكوم طب عام – الدورة الثانية ٢٠١١

تعليمات هامة

على المرشح قراءة هذه الصفحة قبل البدء بالإجابة على الأسئلة والتقيد بالإرشادات التالية:

- ١- كتابة إسمه و شهرته و رقم الامتحان بالحبر وبطريقة واضحة في المكان المخصص لذلك (المربع الملون).
- ٢- إستعمال قلم الرصاص فقط للإجابة على قسمية الأجوبة.
- ٣- عدم إستعمال أي قلم حبر.
- ٤- ملء المربع الصغير ب كامله بالرصاص عند الإجابة.
- ٥- تجنب المحو قدر المستطاع.
- ٦- كل سؤال يتضمن أكثر من إجابة واحدة يعتبر لاغياً.
- ٧- في الحالات الإستثنائية إمح جيداً الجواب الذي ترید أن تغيره.
- ٨- لتجنب الوقوع في الخطأ يمكنك إستعمال ورقة الأسئلة كمسودة على أن ترد عند إنتهاء الامتحان.
- ٩- عدم الكتابة على ورقة الأجوبة إلا في داخل المربعات.
- ١٠- المحافظة جيداً على ورقة الأجوبة والإنتباه إلا تتمزق.
- ١١- مدة الامتحان ثلاث ساعات.
- ١٢- المسابقة تتضمن ١٨٠ سؤالاً.

ملاحظة هامة :

كل مربع مملوء بالحبر أو بأي لون غير الرصاص لن يحسب لأن آلة التصحيح لا تقرأ سوى المربع المملؤ بالرصاص.

شكراً وبال توفيق

*Ministry of Education and Higher Learning
Medicine Colloquium Exam - Second Session 2011*

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Each candidate should read this page before answering the questions. The candidate should follow the directions below :

- 1- *Write clearly your **FIRST** and **FAMILY NAME** and **APPLICANT NUMBER** with ink (pen) in the designated space (colored square).*
- 2- *Please use the pencil **ONLY**.*
- 3- *Do not use any pen (like bic) or ink.*
- 4- *Completely Fill the answer squares using pencil only.*
- 5- ***Only ONE answer** is allowed to each question.*
- 6- *Avoid erasing as much as you can.*
- 7- *When needed, do erase the **cancelled answer** **COMPLETELY**.*
- 8- *You may use the question bookle as scratch, and make sure to return it with the answer sheet at the end of the exam.*
- 9- *On the answer sheet, you should fill up the square corresponding to the right answer, in pencil only. No writing allowed at all.*
- 10- *Keep your answer sheet clean and tidy, do not fold or tear it.*
- 11- *The duration of the exam is **THREE HOURS**.*
- 12- *The composition consists of 180 QUESTIONS.*

Important Note :

Any square filled up with a pen or ink cannot be read by the machine. It reads answers filled up in PENCIL only.

*Thank You
&
Good Luck*

*Ministère de l'Education et de l'Enseignement Supérieur
Examen Colloquium Medecine – Deuxième Session 2011*

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Le Candidat doit lire ces instructions avant de commencer à répondre aux questions et devra observer les directives suivantes :

- 1- *Ecrire son **PRENOM** et **NOM** et son **NUMERO D'EXAMEN** à l'encre et de façon lisible à l'endroit indiqué (coin en couleur)*
- 2- *Utiliser **UNIQUEMENT** un crayon mine.*
- 3- *Ne pas utiliser de stylo à encre ou à bille (encre sèche).*
- 4- *Remplir, sur la fiche de réponse, tout le carré au complet, sans sortir de lignes.*
- 5- *Chaque question qui comporte PLUS D'UNE réponse, est annulée.*
- 6- *Essayer d'éviter, autant que possible, d'effacer.*
- 7- *Dans des cas particulier, il faut **TRES BIEN effacer** la réponse que vous voulez changer.*
- 8- *Pour éviter les erreurs, vous pouvez utiliser la feuille de questions comme brouillon, bien que vous devez la rendre, à la fin de l'épreuve.*
- 9- *Interdiction formelle d'écrire quoique ce soit sur la feuille de réponse en dehors des carrés.*
- 10- *Bien conserver la feuille de réponse ; elle ne doit pas être froissée.*
- 11- *La durée de l'examen est de TROIS HEURES.*
- 12- *La composition comprend 180 QUESTIONS.*

Remarque :

Chaque carré rempli d'encre ou de toute couleur autre que la mine, ne sera pas compté car la machine qui lit les réponses ne peut capter que le signal envoyé par le carré rempli de MINE.

*Merci
&
Bonne Chance*

1	<p>A 23 year-old University student was admitted with uncontrolled hypertension and numbness in the periphery despite the intake of an ACE inhibitor. His primary physical examination was normal except for a BP of 200/120. Laboratory studies revealed serum creatinine of 1mg/dL, Na⁺ 148 mEq/L, K⁺ 2.8 mEq/L and HCO₃ 25 mEq/L. Doppler ultrasound of renal vessels was normal. The most possible cause of this hypertension is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Renal artery stenosis B. Cushing Syndrome C. Primary aldosteronism D. Pheochromocytoma E. Stress from recent exams <p>Un etudiant universitaire age de 23 ans a ete admis pour une hypertension non controlee et un engourdissement peripherique malgre la prise d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Son examen physique primaire est normal excepte pour une tension arterielle a 200/120. les examens de laboratoires revelent une creatinine a 1mg/dL, Na⁺ 148 mEq/L, K⁺ 2.8 mEq/L and HCO₃ 25 mEq/L. l'ultrason avec doppler des vaisseaux du rein sont normaux. La cause la plus possible de cette hypertension est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Stenose de l'artere renale B. Syndrome de Cushing C. Aldosteronisme primaire D. Pheochromocytome E. Stress a cause des examens recents 	<p>طالب جامعي عمره ٢٣ عاماً يعاني من ارتفاع ضغط غير مراقب، وإدراكه محبط بالرغم من تناوله مثبطات خميرة الانجيوتنسين المنقلبة. ان الفحص السريري الاولى كان طبيعياً ما عدا ضغط الدم ٢٠٠/١٢٠. تبين من الدراسة المخبرية ان كرياتينين المصل ١٤٨ مللي مكافئ/ل، K⁺ ٢،٨ مللي مكافئ/ل، HCO₃ ٢٥ مللي مكافئ/ل.</p> <p>الدوبلر للأوعية الكلوية طبيعي. ان السبب الأكثر ترجيحاً لارتفاع الضغط هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. تضيق شريان كلوي B. متلازمة كوشينغ C. الدوستيرونية أولية D. ورم القوائم E. شدة نفسية من الفحوصات السابقة
2	<p>A 40 year old man presents with lateral epicondylitis (i.e tennis elbow). Which of the following treatments is likely to be beneficial?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Corticosteroids for short -term B. Corticosteroids for long-term C. Exercise and immobilization for short-term D. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for long- term E. Bracing for short-term <p>Un homme de 40 ans se presente avec une épicondylite latérale (tennis elbow). Quel est parmi les traitements suivants celui qui est le plus probablement bénéfique ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Les corticostéroïdes à court-term B. Les corticostéroïdes à long terme C. Exercice et immobilisation à court-term des D. Antiinflammatoire non-steroidien à long terme E. Contention à court terme 	<p>رجل عمره ٤١ عاماً يعاني من التهاب لقمة جانبية (مرفق لاعبي التنس). اي من العلاجات التالية يمكن ان تكون مفيدة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. كورتيكوسเตرويدات لفترة قصيرة B. كورتيكوسเตرويدات لفترة طويلة C. التحرير والتمارين لفترة قصيرة D. مضادات التهاب غير ستيروئيدية لفترة طويلة E. ربط لفترة قصيرة

6	<p>A prostigmine test is done for the diagnosis of :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tetanos B. Botulism C. Myasthenia gravis D. Polymyositis E. Polyneuropathy <p>Un test à la prostigmine est fait pour le diagnostic de:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tétanos B. Botulisme C. Myasthénie grave D. Polymyosite E. Polynévrite 	<p>يجرى اختبار البروستيجمين من أجل تشخيص:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. الكزان B. الانسمام الوشيقي C. الوهن العضلي الوخيم D. التهاب عضلي متعدد E. اعتلال عصبي متعدد
7	<p>A 22 years Young man , suffering from fever and umbilical pain secondarily localized to the right iliac fossa with abdominal defense. What is your initial diagnosis? And what is the treatment?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Acute appendicitis, antibiotic treatment B. Acute appendicitis and urgent surgery C. Gastroenteritis and antibiotics D. Ileitis and antibiotics E. Mesenteric adenitis and Monitoring <p>Jeune homme de 22 ans, douleur fébrile de la FID secondairement localisée après une douleur péri ombilicale avec défense de la FID. Quel est votre premier diagnostic? Et quel est le traitement?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Appendicite aigue, traitement antibiotique B. Appendicite aigue et chirurgie urgente C. Gastroentérite et antibiotiques D. Iléite et antibiotiques E. Adénite mésentérique et surveillance 	<p>رجل شاب عمره ٢٢ عاماً، يعاني من حرارة وألم في السرة ثانوي متواضع في الجهة اليمنى للحفرة الحرقافية مع دفاع بطيني. ما هو التشخيص الأولي؟ ما هو العلاج؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب زائدة حاد والعلاج بالمضاد الحيوي B. التهاب زائدة حاد وجراحة عاجلة C. التهاب معدى معوي ومضادات حيوية D. التهاب اللفائي ومضادات حيوية E. التهاب غدي مساريقي ومراقبة

8	<p>A 62 year old man complains of perineal discomfort and reports that there are streaks of fecal soiling in his underwear. Four months ago, he had a perirectal abscess drained surgically. Physical examination shows a perineal opening in the skin lateral to the anus, and a cord-like track can be palpated going from the opening toward the inside of the anal canal. Brownish purulent discharge can be expressed from the tract. Which of the following is the most likely diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> a- Anal fissure b- Anorectal carcinoma c- Fistula-in-ano d- Pilonidal cyst e- Thrombosed hemorrhoids <p>Un homme de 62 ans se plaint de malaise perineale et de souillures fécales sur ses sous-vêtements. Quatre mois auparavant, il a eu un abcès perirectal drainé chirurgicalement. L'examen physique révèle une ouverture perineale cutanée dans la partie latérale de l'anus et on peut palper un trajet induré comme une corde allant de cette ouverture jusqu'à l'intérieur du canal anal. Des sécrétions purulentes brunes s'écoulent de ce tractus suite à la compression. Le diagnostic le plus probable est :</p> <ul style="list-style-type: none"> a- Fissure anale b- Carcinome ano-rectal c- Fistule anale d- Kyste pilonidale e- Hemorroides thrombosees 	<p>رجل عمره ٦٢ عاماً يشكو من انتزاع في العجان ويقول بأن برازه يوشخ كل سنه، منذ ٤ شهور أصيب بخراج حول المستقيم وزر جراحي. بالمعانينة تبين وجود فتحة عجانية في الجلد بجانب الشرج ويجلس كحبيل من الفتحة إلى داخل قناة الشرج. فيح اسمر اللون بنزد إذا ضغط المدخل. أي مما يلي هو التشخيص المحتمل</p> <ul style="list-style-type: none"> -a شق شرجي -b سرطانة شرجية مستقيمة -c تاسور شرجي -d كيسة شعر -e بواسير متختزة
9	<p>Hypertensive hemorrhage occurs most commonly in:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Frontal lobe B. Cerebellum C. Basal ganglia D. Pons E. Occipital lobe <p>L'hémorragie hypertensive se produit le plus fréquemment au niveau :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Lobe frontal B. Cervelet C. Ganglion basal D. Pons E. Lobe occipital 	<p>ان النزيف الناتج عن ارتفاع الضغط هو عادة أكثر حدوثاً في :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. الفص الجبهي B. المخيخ C. العقد القاعدية D. الجسر E. الفص القذالي

10	<p>47 year old male with chronic low back pain prolonged use of NSAIDs. Secondarily generalized sharp epigastric pain. Diffuse abdominal defense on clinical examination. First diagnosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pancreatitis B. Perforated peptic ulcer C. Gastroenteritis D. Cholangitis E. Acute cholecystitis <p>Homme de 47 ans. Lombalgie chronique avec prise prolongée d'AINS. Douleur épigastrique brutale secondairement généralisée. Ventre de bois à l'examen clinique. Premier diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pancréatite B. Ulcère gastroduodénal perforé C. Gastroentérite D. Angiocholite E. Cholécystite aigue 	<p>رجل عمره ٤٧ عاماً لديه الم مزمن في أسفل الظهر ويستخدم منذ فترة طويلة مضادات التهاب غير ستيرويدية. حدث له ألم شرسوفي مفاجئ، معتم. أظهر الفحص السريري دفاع بطني منتشر. التشخيص الأول:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب بنكرياس B. فرحة هضمية متقوية C. التهاب معدى معوي D. التهاب الأقنية الصفراوية E. التهاب مرارة حاد
11	<p>A fixed splitting of S2 is heard in:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ventricular septal defect B. Persistent ductus arteriosus C. Atrial septal defect D. Pulmonary stenosis E. Aortic insufficiency <p>Un dédoublement fixe du deuxième bruit cardiaque se rencontre dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Communication inter-ventriculaire B. Canal artériel persistant C. Communication inter-auriculaire D. Sténose valvulaire pulmonaire E. Régurgitation aortique 	<p>يسمع الإنطمار الثابت لـ S2 في :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. العيب القصبي البطيني B. القناة الشريانية الدائمة C. العيب القصبي الأذيني D. التضيق الرئوي E. القصور الأبهري

12	<p>A 31-year-old G3P2 lady has just delivered a 3.100 grams baby after oxytocin induction and vacuum-assisted delivery. The placenta spontaneously detaches and delivers 6 minutes after delivery of the baby. After the placenta delivers there is a significant blood loss. What is the most likely immediate cause for the postpartum bleeding?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Multiparity B. Retained placenta tissue C. Instrumented delivery D. Uterine atony E. Oxytocin induction <p>Une femme âgée de 31 ans G3P2 vient d'accoucher d'un enfant pesant 3.100 grams après une induction par oxytocine et un accouchement assisté par le vaccum. Le placenta se détache spontanément et s'accouche 6 minutes après la sortie du bébé. Après que le placenta est sorti, il existe une perte sanguine significative. Quelle est la cause la plus fréquente de cette hémorragie immédiate du postpartum ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Multiparité B. Rétention du tissu placentaire C. Accouchement avec des instruments D. Atonie utérine E. Induction à l'oxytocin 	<p>امرأة عمرها ٣١ عاماً G3P2، ولدت طفل وزنه ١،٣ كغ بعد التحرير بالاوكسيتوسين والمساعدة بالتخدير. انفصلت المشيمة بشكل تلقائي بعد ٦ دقائق من ولادة الطفل. بعد خروج المشيمة حصل فقدان دم واضح ما هو السبب الفوري الأكثر ترجيحاً للتزيف بعد الولادة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. تعدد الولادات B. احتجاز نسيج المشيمة C. الولادة بواسطة الآلات D. وني الرحم E. التحرير بالاوكسيتوسين
13	<p>You receive at the emergency room a 22 year-old girl for confusion and agitation. On the physical exam, she does not have fever but she has wheezing and bronchial congestion, miosis and diaphoresis. Her TA is 15 / 9, her pulse is regular at 50/min. You suspect drug poisoning and you want to confirm your suspicion. Which of these tests is the most appropriate?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Dosage of benzodiazepines in urine B- Blood level of transaminases and salicylate C- Dosage of plasma cholinesterase D- Search for opiates in urine E- Determination of cocaine in blood <p>Vous recevez aux urgences une jeune fille de 22 ans, sans antécédents particuliers, pour des troubles de la conscience avec une agitation. À l'examen, elle n'est pas fébrile mais vous trouvez une respiration bruyante par encombrement bronchique, un myosis et une hypersudation. Sa TA est à 15/9 ; son pouls est régulier à 50/min. Vous suspectez une intoxication et vous voulez confirmer votre suspicion. Lequel de ces examens vous semble le plus adéquat chez cette fille ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Dosage des benzodiazépines dans les urines B- Dosage des transaminases et de la salicémie C- Dosage de cholinestérase plasmatique D- Recherche d'opiacés dans les urines E- Dosage de la cocaïne dans le sang 	<p>حضرت فتاة عمرها ٢٢ عاماً إلى غرفة الطوارئ، وهي تشكو من خلط وهياج. تبين من الفحص السريري عدم وجود حرارة ولكن لديها ازيز واحتقان قصبي، تضيق حدقه وتنعرق غزير. ضغطها ٩/١٥، النبض طبيعي ٥٠/د. اشتبهت بتسمم دوائي واردت أن تؤكد اشتباهاك.</p> <p>أي من الفحوصات التالية هو أكثر ملائمة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. جرعة بنزوديازيبين في البول B. مستويات ترانساميناز وسليسيلات في الدم C. جرعة كولين استراز في البلازمما D. التحرري عن الأفيون في البول E. التحرري عن الكوكائين في الدم

14	<p>Which of the following tests is the least accurate for detecting Helicobacter pylori infection?</p> <ol style="list-style-type: none"> Urea breath test Stool antigen test Serology for immunoglobulin G antibodies Culture <p>Quel est parmi les tests suivants celui qui est le moins fiable pour détecter une infection à helicobacter pylori ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Le test de l'urée respiratoire Le test de l'antigène des selles Sérologie à la recherche d'anticorps IGG Culture 	<p>أي من الفحوص التالية هو الأقل دقة في التحري عن انتان المتفوسات البوابية ؟</p> <p>A. فحص التحري عن البوابيا في التنفس B. فحص التحري عن المستضد في البراز C. الفحص المصلي للتحري عن الاشداد من نوع الغلوبولينات المناعية G D. الزرع</p>
15	<p>An 8-year-old, febrile child is admitted to the pediatric department. Large lymph nodes are palpable on both sides of the neck. The examination reveals pharyngitis and hepatosplenomegaly. No symptoms of anemia or bleeding are observed. Atypical mononuclear cells are seen in the peripheral blood smear.</p> <p>What is the most likely diagnosis?</p> <ol style="list-style-type: none"> leukemia toxoplasmosis lymphoma infectious mononucleosis cytomegalovirus infection <p>Un enfant âgé de 8 ans qui est febrile est admis dans le département de pédiatrie. Des adénopathies larges sont palpables au niveau des deux côtés du cou. L'examen physique révèle une pharyngite et une hépatosplénomégalie. Il n'y a pas de symptômes d'anémie et d'hémorragie. Des cellules mononucléaires atypiques sont trouvées à l'examen d'un frottis sanguin.</p> <p>Quel est le diagnostic le plus probable ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Leucémie Toxoplasmose Lymphome Mononucléose Infectieuse Infection à cytomegalovirus 	<p>أدخل طفل عمره 8 سنوات، يعاني من ارتفاع حرارة، إلى قسم الأطفال. العقد الليمفاوية على جانبي الرقبة كبيرة ومجوسية. تبين من الفحوص اصابته بـ التهاب البلعوم وضخامة كبد وطحال. لم تلاحظ اعراض فقر دم أو نزوف. شوهدت خلايا وحيدة النوى لأنمطية في لطاخة الدم المحيطي. ما هو التشخيص الأكثر ترجيحاً؟</p> <p>A. إبيضاض الدم B. التوكسوبلاسما C. ورم ليمفاوي D. انتان وحدات النوى E. انتان الفيروس المضخم للخلايا</p>

16	<p>Which class of agents can cause dangerous cardiac side effects in overdose?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Beta-blockers B. Aminoglycosides C. Tricyclic antidepressants D. Thiazide diuretics E. Calcium channel blockers <p>Quelle classe de médicaments peut causer d'effets cardiaques sérieux en cas de surdosage?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Béta-bloquants B. Aminoglycosides C. Antidépresseurs tricycliques D. Diurétiques thiazidiques E. Anticalciques 	<p>أي صنف من الأدوية يمكن أن يسبب بتأثيرات جانبية قلية خطيرة في الجرعات الزائدة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. حاجبات بيتا B. أمينو غلوكوزيدات C. مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقة D. مدرات التيازيد E. حاجبات قنوات الكالسيوم
17	<p>A 14 month-old boy is brought to the Primary Health Care center because of audible wheezing. The mother's pregnancy and delivery were normal. He has had no previous health problems and his immunizations are up to date. The child looks well, the rectal temperature is 37.6°C, and there is a clear nasal discharge and intercostal retraction. High pitched wheezes are heard over both lung fields. Which one of the following is the most likely diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bronchiolitis B. Bronchial asthma C. Bacterial pneumonia D. Bronchial foreign body E. Croup <p>Un garçon âgé de 14 mois est amené au centre de soin primaire pour des wheezing audible. La grossesse et l'accouchement chez la maman étaient normaux. Cet enfant n'a jamais eu de problème et son programme d'immunisation est à jour. L'enfant paraît bien, la température rectal est de 37.6°C, il existe un écoulement nasal clair et une rétraction intercostale. Des wheezings sont entendus au niveau des deux champs pulmonaires. Quelles est parmi les suivantes le diagnostic le plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bronchiolite B. Asthme bronchique C. Pneumonie bactérienne D. Corps étranger bronchique E. Croup 	<p>حضر طفل عمره ١٤ شهراً إلى مركز العناية الصحية الأولية بسبب أزيز مسموع. ان حمل ولادة الأم كان طبيعي. لم يشكو من مشاكل صحية من قبل وتمتنعه منتظم. مظهر الطفل جيد، درجة الحرارة الشرجية ٣٧.٦°C ، وهناك نسخ أنفي صافي وإنكماش بين الأضلاع. يسمع أزيز ذات صوت عالي فوق منطقة الرئتين. أي من التالي هو التشخيص الأكثر ترجحاً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب قصبيات B. ربو قصبي C. ذات رئة جرثومي D. جسم غريب قصبي E. خانوق

18	<p>A 3-year-old male is brought to your clinic because of ear pain. On examination you find a round, plastic bead in the lower third of the ear canal close to the tympanic membrane. You restrain the child and are unable to remove the object despite several attempts, first using water irrigation and then fast-acting glue on an applicator.</p> <p>Which one of the following is the best option for removal?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. A plastic loop curette through an otoscope B. Referral for removal under anesthesia C. Grasping with forceps D. Applying acetone to dissolve the object <p>Un enfant de 3ans est amene a votre clinique a cause d'une douleur au niveau de l'oreille. A l'examen vous trouvez une petite boule de plastique qui est au niveau du tiers inferieur du conduit auditif pres de la membrane tympanique. Vous essayez d'enlever l'objet et vous n'arrivez pas malgré plusieurs essais, vous avez utilisé en premier l'irrigation a l'eau, puis vous avez essayé avec de la colle a l'enlever. Parmi les suivants quelle est la première option pour l'enlever ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Une curette en plastique a travers un otoscope B. Le référer pour enlever le corps étranger sous anesthésie C. Enlever avec une pince D. Appliquer de l'acétone pour dissoudre l'objet 	<p>حضر طفل عمره ٣ سنوات إلى عيادتك بسبب ألم في الأذن. بعد إجراء الفحص تبين وجود خرزة بلاستيك دائريّة في الثلث السفلي لقناة الأذن بالقرب من غشاء الطبقة. لقد قمت بتهيئة الطفل واجراء عدة محاولات لإزالة هذه الخرزة ولكنك لم تستطع بالرغم من استخدامك الغسل بالماء أولاً ومن ثم استخدام أداة عليها صنع سريع. أي من التالي هو أفضل طريقة لإزالة هذه الخرزة ؟</p> <p>A. استعمال مكشطة ذات عروة بلاستيكية من خلال منظار الأذن</p> <p>B. العمل على ازالتها تحت التخدير</p> <p>C. استعمال الملفت</p> <p>D. تطبيق الأستون لازابة هذا الشيء</p>
19	<p>Which of following arrhythmias is commonly associated with syncope?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Sinus arrhythmia B. First degree heart block C. Second degree heart block D. Third degree heart block E. Tachycardia <p>Laquelle des arythmies suivantes est fréquemment associée à une syncope?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Arythmie sinusale B. Bloc AV du premier degré C. Bloc AV du second degré D. Bloc AV du troisième degré E. Tachycardie 	<p>أي من الانظمية التالية تترافق عادة مع غشي ؟</p> <p>A. لانظمية جيبيبة</p> <p>B. حجب قلبي من الدرجة الأولى</p> <p>C. حجب قلبي من الدرجة الثانية</p> <p>D. حجب قلبي من الدرجة الثالثة</p> <p>E. تسارع قلب</p>

20	<p>Which of the following is the preferred diagnostic test in a woman with a low mean corpuscular volume and suspected iron deficiency anemia</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Serum iron B. Serum ferritin C. Transferrin ferritin saturation D. Serum transferrin receptor <p>Quelle est parmi les suivantes le test diagnostique préférable chez une femme qui a un volume corpusculaire moyen bas et une suspicion d'anémie ferriprive ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fer sérique B. Ferritine sérique C. Saturation de la ferritine transférente D. Recepteur du transférente sérique 	<p>اي من التالي هو الفحص التشخيصي المفضل لامرأة لديها حجم كرويات منخفض واحتمال فقر دم بعوز الحديد ؟</p> <p>A- حديد الدم B- فريتين المصل C- اشباع فيررتين ترانس فيرين D- مستقبل ترانسفرين المصل</p>
21	<p>Contraindications to lithium administration include (one answer):</p> <ul style="list-style-type: none"> A. an administration in combination with chlorpromazine (Thorazine) B. the presence of a renal disease C. any occurrence of the symptoms of schizophrenia D. the presence of depression E. an administration in combination with imipramine (Tofranil) <p>Les contraindications à l'administration du Lithium sont (une seule réponse):</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Une administration en combinaison avec le Chlorpromazine (Thorazine) B. La présence de maladie rénale C. Symptômes de schizophrénie D. La présence de dépression E. Une administration en combinaison avec l'Imipramine (Tofranil) 	<p>ان مضادات استطباب الليتيوم تتضمن (جواب واحد) :</p> <p>A. اعطائه بالمشاركة مع كلوربرومازين (ثورازين) B. وجود داء كلوبي (أي وجود لأعراض الفصام) C. وجود إكتئاب (وجود إكتئاب) D. اعطائه بالمشاركة مع أميبيرامين (توفرانيل) E. اعطائه بالمشاركة مع اميپيرامين (توفرانيل)</p>

22	<p>A 32 year old woman comes to the office complaining of palpitations. On examination, she has fixed split S2 and a mid flow murmur at the upper left sternal border. ECG reveals a right axis deviation. What is the most likely underlying cardiac disorder?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mitral valve prolapse B. Moderate-to-severe anemia C. Ventricular septal defect D. Atrial septal defect E. Pulmonic stenosis <p>Une femme de 32 ans se présente pour palpitations. A l'examen physique, on note un dédoublement fixe de S2 et un souffle systolique au niveau du rebord sternal gauche au 2ème espace intercostal. Quelle est la pathologie cardiaque la plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Prolapsus de la valve mitrale B. Anémie modérée à sévère C. Communication inter-ventriculaire D. Communication interauriculaire E. Sténose pulmonaire 	<p>امرأة عمرها ٣٢ عاماً تشكُّ من خفقات. عند الفحص، كان لديها انشطار ثابت S2 ونفخة وسط الإنقباض في الحافة القصبية اليسرى العلوية. تبيّن من تحطيط القلب الكهربائي انحراف محوري أيمين. ما هو العامل الأكثر ترجيحاً الذي يسبّب هذا الإضطراب القلبي؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. تدكّي الصمام المترالي B. فقر دم متوسط إلى شديد C. عيب في الحاجز البطيني D. عيب في الحاجز الأذيني E. تضيق رئوي
23	<p>Compression of the neural elements facing the L2 vertebra can result in all of the following except</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Entrapment of L2 root B. Entrapment of the Cauda equine C. Entrapment of the L5 root D. Cord compression <p>Une compression neurologique face à L2 peut occasionner tout sauf</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Une atteinte de la racine L2 B. Une atteinte de la queue de cheval C. Une atteinte de la racine L5 D. Une atteinte de la moelle 	<p>ان اضغاط العناصر العصبية المواجهة للققرة L2 يمكن ان يؤدي إلى كل ما يلي ما عدا :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. انفخاخ جذر L2 B. انفخاخ ذنب الفرس C. انفخاخ جذر L5 D. اضغاط النخاع

24	<p>You are consulted in your clinic by a 40 year-old man for mononeuritis. He doesn't have cardiovascular risk factors. You note in the history of the patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Many episodes of febrile oligoarthritis for 5 years, . An episode of orchi epididymitis one year earlier, . He was operated, 2 months ago for cholecystitis, which was acalculous. <p>What is the vasculitis that best fits this clinical picture?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Behçet's Disease B- Churg-Strauss C- Wegener's Disease D- Polyarteritis nodosa E- Microscopic polyangiitis <p>Vous êtes consulté dans votre clinique par un homme de 40 ans, sans facteurs de risque cardiovasculaire, pour une multinévrite. A l'interrogatoire, vous notez:</p> <ul style="list-style-type: none"> . qu'il présente, depuis 5 ans, des épisodes d'oligoarthrites fébriles . qu'il a eu, un an auparavant, une orchiépididymite . qu'il a été opéré, il y a 2 mois, pour une cholécystite, qui s'est révélée être alithiasique. <p>Quelle est la vascularite qui correspond le mieux à ce tableau clinique ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Maladie de Behçet B- Churg et Strauss C- Maladie de Wegener D- Périartérite noueuse E- Polyangéite microscopique. 	<p>رجل عمره ٤٠ عاماً يشكو من التهاب عصب أحادي. ليس لديه عوامل مهددة قلبية وعائية.</p> <p>تبين من سيرته المرضية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدة نوبات من التهاب المفاصل القليلة الحرورية - نوبة التهاب خصية وبربخ منذ سنة - اجريت له جراحة منذ شهرين بسبب التهاب مرارة غير حصوي. <p>ما هو الالتهاب الرئيسي الذي يتاسب مع هذه الصورة السريرية ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. داء بهجت B. سورغ وشتراوس C. داء ويغنز D. التهاب شريان متعدد عقدي E. التهاب وعائي مجهرى
----	---	---

25	<p>A 26-year-old female presents with a 1-year history of recurring abdominal pain associated with intermittent diarrhea, 5-7 days per month. Her pain improves with defecation. There has been no blood in her stool and no weight loss. Laboratory findings are normal, including a CBC, chemistry profile, TSH level, and antibodies for celiac disease. Which one of the following would be most appropriate at this point?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Colonoscopy B. An upper GI series with small-bowel follow-through C. A gluten-free diet D. Educate her about her condition E. Ask her to drink fluids <p>Une femme âgée de 26 ans se présente pour une histoire de douleur abdominale récurrente depuis 1an. Cette douleur est associée à une diarrhée intermittente 5 à 7 jours par mois. Sa douleur s'améliore avec la défécation. Il n'y a pas de sang dans les selles et pas de perte de poids. Les examens du laboratoire sont normaux, incluant une numération formule, un profil chimique, taux de TSH et les anticorps pour la maladie coeliaque. A ce point quel est parmi les suivants celui le plus approprié ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Colonoscopie B. Un repas baryté avec un transit du grêle C. Une diète sans gluten D. Education concernant son état E. Lui demander de boire des liquides 	<p>امرأة عمرها ٢٦ عاماً تعاني من ألم بطني متكرر منذ سنة متافق مع إسهال متقطع، ٥-٧ أيام بالشهر. يتحسن الماء عند التبرز. لا يوجد دم في البراز ولا تعاني من فقدان وزن.</p> <p>الفحوصات المخبرية طبيعية، تتضمن تعداد الكريات، الجانب الكيميائي، مستوى TSH، والأضداد لداء بطيء. أي من التالي يمكن ان يكون الأقرب في هذه المرحلة ؟</p> <p>A. تنظير القولون</p> <p>B. سلسلة إجراءات في الجهاز الهضمي العلوي مع متابعة للإمعاء الدقيقة</p> <p>C. نظام حمية خال من الغلوتين</p> <p>D. تقييدها عن حالتها</p> <p>E. الطلب منها شرب سوائل</p>
26	<p>Which of the following drugs is recommended as a first-line therapy for patients with hypertension and diabetes?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lisinopril (ACE) B. Atenolol (beta-blocker) C. Verapamil (Isoptin) D. Amlodipine (Amlor) <p>Quel est parmi les médicaments suivants celui qui est recommandé comme une ligne de traitement pour les patients ayant un diabète et une hypertension ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lisinopril (ACE) B. Atenolol (beta-blocker) C. Verapamil (Isoptin) D. Amlodipine (Amlor) 	<p>أي من الأدوية التالية هو خط علاج أول للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط وداء سكري ؟</p> <p>A. لisinopril (ACE)</p> <p>B. اتينولول (جاجب بيتا)</p> <p>C. فيراپاميل (ايزوتين)</p> <p>D. املوديبين (amlor)</p>

27	<p>Conditions associated with an increased risk of colon cancer include all of the following except:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ulcerative colitis B. Diverticulosis C. Crohn's disease of the colon D. Gardner's syndrome E. Villous adenoma of the cecum <p>Les conditions associées à un risque augmenté du cancer du colon comprennent tout ce qui suit SAUF :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Colite ulcereuse B. Diverticulose C. Maladie de Crohn colique D. Syndrome de Gardner (polypose familiale) E. Adenome villosus du cecum 	<p>تتضمن الحالات المترافقية مع ارتفاع خطر حدوث سرطان قولون كل ما يلي ما عدا :</p> <p>A. التهاب قولون متقرح B. داء الرتوج C. داء كروهن في القولون D. متلازمة غارنر E. ورم غدي زغابي للأعور</p>
28	<p>Which one of the following is the best option for supporting a sprained ankle?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tape B. Cast C. Semi-rigid or lace-up support D. Elastic bandage <p>Quelle est parmi les suivantes la meilleure option pour la contention d'une entorse de la cheville ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ruban adhésif B. Plâtre C. Un support semi rigide D. Bandage élastique 	<p>أي من التالي هو أفضل خيار لدعم扭伤 الكاحل؟</p> <p>A. شريط لاصق B. حبيرة C. حامل نصف صلب او رباط D. رباط ضاغط</p>
29	<p>A two year old girl was well until 12 hours ago, when she begins to develop lethargy, vomiting, and episodes of intermittent cries during which it seems to have abdominal pain. During the examination, it develops a bloody mucus stools with jelly aspects and a painful abdomen. The most likely diagnosis is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A-pyloric stenosis B-Appendicitis C-Urinary tract infection D-Intussusception E-Peptic Ulcer <p>Une fillette de deux ans allait bien jusqu'à il y a 12 heures, quand elle commence à développer une léthargie, des vomissements, et des épisodes de cris intermittents durant lesquels elle semble avoir des douleurs abdominales. Durant l'examen clinique, elle développe une selle couleur marron et a un abdomen douloureux. Le diagnostic le plus probable est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Sténose du pylore B- Appendicite C- Infection urinaire D- Invagination intestinale E- Ulcère peptique 	<p>طفلة عمرها ستة كانت جيدة قبل 12 ساعة، عندما بدأت تعاني من نوام، اقياء ونوب بكاء متقطعة على ماهيلو بسبب آلم بطني. خلال الفحص، كان برازها مخاطي مدمي هلامي وألم بطني. ان التشخيص الاكثر ترجيحاً هو:</p> <p>A. تضيق بوابي B. التهاب زائدة C. انتان مجاري بولية D. انغلاف معوي E. فرحة معوية</p>

30	<p>A 63 years old Man , presenting with occasional rectal bleeding since three months and diarrhea alternating with constipation with weight loss of 10 kgs. First diagnosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Colon cancer B. Infectious colitis C. Hemorrhoids D. Anal fistula E. Hyperthyroidism <p>Homme de 63 ans, depuis 3 mois rectorragies occasionnelles et alternance diarrhée constipation avec amaigrissement involontaire de 10 kgs. Premier diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Cancer du colon B. Colite infectieuse C. Hémorroïdes D. Fistule anale E. Hyperthyroïdie 	<p>رجل عمره ٦٣ عاماً، يشكو من نزيف شرجي منذ ٣ أشهر وإسهال مع امساك متتالي وفقدان ١٠كغ من وزنه. التشخيص الأول :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. سرطان قولون B. التهاب قولوني انتاني C. بواسير D. ناسور شرجي E. فرط نشاط درق
31	<p>Which one of the following statements about older patients with cholecystitis is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Murphy's sign is an accurate indicator of cholecystitis B. Most have back or flank pain C. All have nausea D. More than one half of patients are afebrile <p>Quelle est parmi les propositions suivantes, la proposition exacte, concernant les malades ages ayant une cholecystite ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Le signe de Murphy est un indicateur fiable de la cholecystite B. La plupart ont des douleurs de dos ou du flanc C. Tous ont des nausées D. Plus que la moitié des patients sont afebrile 	<p>اي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة لمرضى كبار في السن يعانون من التهاب مرارة ؟</p> <p>ان علامة مورفي هي مؤشر اكيد للإصابة بالتهاب المرارة A</p> <p>معظمهم يعانون من ألم في الخاصرة او في الظهر B</p> <p>جميعهم يعانون من غثيان C</p> <p>اكثر من نصف المرضى لا ترتفع حرارتهم D</p>

32	<p>Which of the following statements about herniated disk is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Twenty percent of patients with acute low back pain have a herniated disk B. Few patients with herniation have a sciatica C. Herniated disc is seen only in patients with symptoms of sciatica D. Physical examination findings are not useful in localizing the level of the disc herniation <p>Quelle est la proposition exacte concernant une hernie discale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Vingt pour cent des patients ayant une douleur lombaire aigue basse ont une hernie discale B. Quelques patients ayant une hernie ont une sciatique C. La hernie discale est trouvée seulement chez des patients ayant des symptômes de sciatique D. Les données de l'examen physique ne sont pas utiles pour localiser le niveau de la hernie discale 	<p>أي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة للفرص المنفق؟</p> <p>A. عشرون بالمئة من المرضى الذين يعانون من ألم حاد في أسفل الظهر، مصابون بفرص منفقة.</p> <p>B. قليل من المرضى الذين لديهم انتفاخ يعانون من عرق النساء.</p> <p>C. يشاهد الفرنس المنفق فقط عند المرضى الذين لديهم اعراض عرق النساء.</p> <p>D. ان الفحوصات السريرية غير مفيدة لتحديد مستوى الفرنس المنفق.</p>
33	<p>Which one of the following therapies is most likely to improve outcomes in patients with ankle sprains?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Therapeutic ultrasonography B. Application of heat C. Non-steroidal anti-inflammatory D. Immobilization <p>Quelle est parmi les thérapies suivantes celle qui améliore le plus souvent les patients ayant une entorse de la cheville ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ultrason thérapeutique B. Application de chaleur C. Antiinflammatoire non steroidien D. Immobilisation 	<p>أي من العلاجات التالية يمكن أن تحسن من حالات المرضى الذين يعانون من التواء في الكاحل؟</p> <p>A. تخطيط الصدى علاجي</p> <p>B. تطبيق الحرارة</p> <p>C. مضاد التهاب غير ستيرونيدي</p> <p>D. التشريح</p>
34	<p>A 23 year old student complains of sore throat for three days. He started with a runny nose and a slight cough. The symptoms are a little better this morning. Which of the following is most likely?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rhinovirus B. Neisseria gonorrhoeae C. Hemophilus influenza D. Corynebacterium diphtheriae E. Streptococcus pyogenes (A) <p>Un jeune étudiant de 23 ans se plaint de douleur à la gorge depuis 3 jours. Ses symptômes ont commencé avec un écoulement nasal et une légère toux. Il va un peu mieux ce matin. Quel est la cause la plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rhinovirus B. Neisseria gonorrhoeae C. Hemophilus influenza D. Corynebacterium diphtheriae E. Streptococcus pyogenes (A) 	<p>طالب عمره ٢٣ عاماً يشكو من بحة منذ ثلاثة أيام. بدأ بسيلان أنفي وسعال خفيف. الأعراض أفضل بقليل هذه الصباح. أي من الأسباب التالية هو الأكثر ترجحاً؟</p> <p>A. فيروس الأنفي</p> <p>B. المكورات النيسارية</p> <p>C. المستدميات النزلية</p> <p>D. الورديات الخناقية</p> <p>E. المكورات العقدية الفيروسية</p>

35	<p>A 39-year-old female presents with lower abdominal/pelvic pain. On examination, with the patient in a supine position, you palpate the tender area of her abdomen. When you have her raise both legs off the table while you palpate the abdomen, her pain intensifies. Which one of the following is the most likely diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Appendicitis B. A hematoma within the abdominal wall musculature C. Diverticulitis D. Pelvic inflammatory disease E. An ovarian cyst 	<p>حضرت إمرأة عمرها ٣٩ عاماً وهي تعاني من ألم في الحوض وأسفل البطن. عند إجراء الفحص، في وضعية الاستفقاء، أجري جس المنطقة المؤلمة من البطن، وعند رفع رجليها على الطاولة أثناء جس البطن، إشتد ألالمها. أي من التالي هو التخمين الأكثر ترجحاً؟</p> <p>A. التهاب زائدة دودية B. ورم دموي ضمن جدار العضلات الطنبية C. التهاب الرتاج D. داء التهابي في الحوض E. كيسة في المبيض</p>
36	<p>Une femme âgée de 39 ans se présente pour des douleurs abdominales pelviennes basses. A l'examen, la patiente étant en décubitus dorsal, vous palpez une zone douloureuse au niveau de l'abdomen. Quand vous lui demandez de soulever les deux jambes de la table de l'examen alors que vous lui palpez son ventre, sa douleur augmente. Quelle est parmi les suivantes le diagnostic le plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Appendicite B. Un hématome au niveau de la musculature de la paroi abdominale C. Diverticulite D. Maladie inflammatoire pelvienne E. Kyste ovarien 	
	<p>What type of breast cancer is the most common and to what location?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Ductal, superior external quadrant B- Cystosarcoma, inferior internal quadrant C- Lobular, superior internal quadrant D- Medullary, superior external quadrant E- Cystosarcoma, inferior external quadrant <p>Quel type de cancer du sein est le plus fréquent et dans quelle localisation ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Canalaire, quadrant supéro-externe B. Cystosarcome, quadrant inféro-interne C. Lobulaire, quadrant supéro-interne D. Médullaire, quadrant supéro-externe E. Cystosarcome, quadrant inféro-externe 	<p>ما هو نوع سرطان الثدي الأكثر شيوعاً وفي أي موضع؟</p> <p>A. قنوي ، الربع العلوي الجانبي B. ساركومة كيسية، الربع السفلي الداخلي C. فصيصي ، الربع العلوي الداخلي D. كبي، الربع العلوي الجانبي E. ساركومة كيسية، الربع السفلي الجانبي</p>

37	<p>Which of the following is more consistent with the diagnosis of epidydimitis than with testicular torsion?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fever, urgency and other urinary symptoms B. Recurrent episodes of pain C. Abnormal cremasteric reflex D. Exacerbation of pain with elevation of the testis (Prehn sign) <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui va avec le diagnostic d'epidydimate plutôt qu'une torsion testiculaire ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fièvre, symptômes urinaires et symptômes d'urgence urinaires B. Episodes de douleur récurrentes C. Reflexe cremasterien anormal D. Exacerbation de la douleur avec l'élévation du testicule (signe de Prehn) 	<p>أي من التالي هو أكثر انسجاماً مع تشخيص التهاب البربخ منه مع اللوي الخصوي؟</p> <p>A. حرارة وأعراض بولية أخرى B. نوبات متكررة من الألم C. منعكس غير طبيعي للمسمرة D. تفاقم الألم عند رفع الخصية (علامة برلن)</p>
38	<p>A 65 year-old man develops superficial thrombophlebitis in multiple sites including the arms and chest. He has had several episodes in the past couple of months, each of which lasted few days. Which of the following neoplasms is most closely associated with this patient's clinical problem?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Prostatic carcinoma B. Lung carcinoma C. Pancreatic carcinoma D. Acute promyelocytic leukemia E. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria <p>Un homme age de 65 ans developpe des thrombophlebites superficielles en plusieurs endroits comprenant les bras et le thorax. Il a eu plusieurs episodes similaires dans les derniers mois. Chacun a persisté plusieurs jours. Quel est parmi les neoplasmes suivants qui le plus probablement est associe au probleme clinique de ce patient ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Carcinome prostatique B. Carcinome pulmonaire C. Carcinome pancréatique D. Leucemie aigue promyelocytaire E. Hemoglobinurie paroxystique nocturne 	<p>رجل عمره ٦٥ عاماً أصيب بالتهاب خثاري وريدي سطحي في مواقع متعددة تتضمن اليدين والصدر. كان قد حدث له عدة نوب في الشهرين الماضيين، كل واحدة منها استمرت بضعة أيام. أي من الأورام التالية هي الأكثر تزافقاً لمشكلة المريض السريرية؟</p> <p>A. سرطان البروستات B. سرطان الرئة C. سرطان بنكرياسي D. ابيضاض سلائف النقويات الحاد E. البيلة الهايموغلوبينية الليلية الانسجوية</p>

39	<p>Which one of the following findings is an indication for imaging in patients with acute low back pain?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Failure to respond to conservative therapy after two to three weeks. B. Bilateral leg weakness. C. Sciatica in one leg. D. Positive result on straight leg raise <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui est une indication d'imagerie chez les patients ayant une douleur lombaire basse ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Echec de reponse au traitement conservateur après 2 à 3 semaines B. Faiblesse bilatérale des deux jambes C. Une sciatique au niveau d'une jambe D. Résultat positif en soulvant la jambe 	<p>أي من التالي يستدعي التصوير عند مرضى يعانون من ألم حاد في أسفل الظهر ؟</p> <p>A. فشل الاستجابة بعد أسبوعين لثلاث أسابيع من العلاج الحفاظي</p> <p>B. ضعف ثنائي الجانب في الرجلين</p> <p>C. عرق النساء في رجل واحدة</p> <p>D. نتيجة إيجابية عند الرفع المستقيمي للرجل</p>
40	<p>Which of the following statements about mammography is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Digital mammography is diagnostically more accurate in all women B. Digital mammography is more sensitive in women with denser breasts C. Mammography should be discontinued at 70 years of age D. Mammography is as effective at reducing mortality in younger women as in older women <p>Quelle est la proposition exacte concernant la mammographie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mammographie digitale est plus précise dans le diagnostic chez toutes les femmes B. Mammographie digitale est plus sensible chez les femmes ayant des seins denses C. La mammographie doit être arrêter après l'âge de 70 ans D. La mammographie est aussi efficace à réduire la mortalité chez les femmes jeunes autant que chez les femmes âgées 	<p>أي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة لتصوير الثدي الشعاعي ؟</p> <p>A. ان تصوير الثدي الشعاعي الرقمي هو التشخيص الأكثر دقة لكل النساء</p> <p>B. ان تصوير الثدي الشعاعي الرقمي هو أكثر حساسية عند النساء ذات الثدي الكثيف</p> <p>C. يجب ايقاف عمل تصوير الثدي الشعاعي عند عمر ٧٠ عاماً</p> <p>D. ان التصوير الثدي الشعاعي يؤثر في تخفيف نسبة الوفيات عند الشباب مثل النساء</p>

41	<p>A 23 year old female patient comes to the ER with intense and continuous 10/10 pain in the right iliac fossa accompanied by severe nausea. She mentions a 1 week delay of menstruation with a positive pregnancy test. What is the diagnosis to suspect first?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Appendicitis B. Ectopic pregnancy C. Renal colic D. Irritable Colon E. Colon cancer <p>Une femme de 23 ans se présente aux urgences pour une douleur de la fosse iliaque droite d'emblée très intense 10/10 et continue accompagnée de nausées importantes. Elle notait un retard de règles de 1 semaine avec un test de grossesse qui est revenu positif. Quel est le diagnostic à évoquer en premier ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Appendicite B. Grossesse Extra Utérine C. Colique néphrétique D. Colon irritable E. Cancer colique 	<p>مريضه عمرها ٢٣ عاماً حضرت إلى غرفة الطوارئ وهي تشكو من ألم في الحفرة الهرقية اليمنى شديد ومستمر ١٠/١٠ مترافق مع غثيان شديد. اوضحت بأن الدورة الشهرية تأخرت أسبوعاً واحداً مع فحص حمل إيجابي.</p> <p>ما هو التشخيص المعتقد أولاً :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب زائدة B. حمل خارج الرحم C. مغص كلوي D. قولون متهدج E. سرطان قولون
42	<p>In a patient with cerebral tumor and intracranial hypertension, papilledema is :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. unilateral, on the side of the brain tumor B. unilateral, on the contralateral side of the brain tumor C. pulsatile D. bilateral E. macular <p>Chez un patient ayant une tumeur cérébrale et hypertension intracrânienne, l'oedème papillaire est:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Unilatéral du même côté que la tumeur B. Unilatéral, du côté opposé à la tumeur C. Pulsatile D. Bilatéral E. Maculaire 	<p>عند مريض يعاني من ورم دماغي وارتفاع ضغط داخل القحف. إن وذمة حلبة العصب البصري، هي :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. احادية الجانب، بجانب ورم الدماغ B. احادية الجانب، بالجانب المقابل لورم الدماغ C. نابضة D. ثنائية الجانب E. بقعية

43	<p>Which one of the following is NOT an absolute contraindication to vaginal delivery?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Complete placenta previa B. Primary herpes simplex virus with active genital lesions C. Previous classic uterine incision D. Treated human immunodeficiency virus infection <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui n'est pas une contreindication absolue à l'accouchement par voie vaginale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Placenta previa absolue B. Virus d'herpes simplex primaire avec lesion génitale active C. Antecedent d'incision utérine classique D. Une infection de HIV traitée 	<p>اي من التالي هو ليس مضاد استطباب مطلق للولادة المهبلية ؟</p> <p>A. إنزياب كامل للمشيمة B. اصابة أولية بفيروس الحلاع البسيط مع وجود آفات تناصيلية ناشطة C. شق رحمي كلاسيكي سابق D. اصابة بفيروس عوز مناعة بشرى ثم معالجته</p>
44	<p>In temporal arteritis, select from the following signs the wrong answer.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Headache B. Sudden blindness C. Polymyositis with elevated CPK D. Claudication of the jaw E. Fever <p>Dans l'artérite temporaire, choisir parmi les signes suivants la réponse fausse.</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Céphalées B- Amaurose fugace C- Polymyosite avec CPK élevés D- Claudication de la mâchoire E- Fièvre 	<p>في حالة التهاب الشريان الصدغي، اي من التالي هو الجواب الخطا :</p> <p>A. الصداع B. عمى مفاجيء C. التهاب عضلي متعدد مع ارتفاع CPK D. عرج فكري E. حرارة</p>
45	<p>Chorionic villus sampling for genetic diagnosis is performed between:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 13-15 weeks of gestation B. 16-18 weeks of gestation C. 10 -13 weeks of gestation D. 14-20 weeks of gestation <p>La biopsie de villosité chorionique pour le diagnostic génétique est fait entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 13-15 semaines de grossesse B. 16-18 semaines de grossesse C. 10-13 semaines de grossesse D. 14-20 semaines de grossesse 	<p>يتم الحصول على عينة زغابة مشيمية، من أجل تشخيص وراثي، بين :</p> <p>A. 15-13 أسبوع من الحمل B. 18-16 أسبوع من الحمل C. 13-10 أسبوع من الحمل D. 20-14 أسبوع من الحمل</p>

46	<p>A 63 year old woman comes to see you with a proximal muscle weakness and general bone pains. Her calcium and phosphate levels are slightly low and her alkaline phosphatase level is raised. Which one of the following is the single best possible diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Hyperparathyroidism B. Myeloma C. Osteomalacia D. Osteoporosis E. Rickets <p>Une femme âgée de 63 ans se présente avec une faiblesse proximale des muscles et une douleur généralisée osseuse. Son calcium et son phosphore sont légèrement diminués et le taux de phosphatase alkaline est élevé. Quelle est parmi les suivantes le meilleur diagnostic possible?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Hyperparathyroidie B. Myelome C. Osteomalacie D. Osteoporose E. Rachitisme 	<p>امرأة عمرها ٦٣ عاماً تعاني من و hen عضلي مباشر وألم عظمي معتمدة. ان مستويات الكالسيوم والفوسفات منخفضة قليلاً والفوسفاتاز القلوية مرتفعة. اي من التالي هو التشخيص الوحيد المحتدل؟</p> <p>A. فرط نشاط جارات الدرق B. ورم نقي C. تلين العظام D. هشاشة عظام E. كساح</p>
47	<p>For which of the following findings, a referral to an ophthalmologist is recommended?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ciliary flush B. Preauricular lymph node enlargement C. Conjunctival hyperemia D. Purulent discharge <p>Pour lequel parmi les suivants, une consultation chez un ophtalmologue est recommandée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Des flâches ciliaires B. Ganglions augmentes de volume en periauriculaire C. Hyperémie conjonctivale D. Ecoulement purulent 	<p>في اي من الحالات التالية يجب مراجعة طبيب العيون؟</p> <p>A. احمرار الأهداب B. تضخم العقد اللمفاوية قبل الاذينية C. تبليغ الملتحمة D. نصح قيحي</p>

48	<p>A 27-year-old nulligravid woman has severe dysmenorrhea and occasional pain during sexual intercourse. She weighs 50 kg and is 160 cm tall. Pelvic examination is within normal. Ultrasound revealed a left ovary of 2×3 cm and right ovary of 4×6 cm. Which of the following is the most likely cause of her condition?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chronic appendicitis B. Endometriosis C. Pelvic congestion syndrome D. Polycystic ovarian disease E. Premenstrual syndrome <p>Une femme âgée de 27 ans nulligravid présente une dysménorrhée sévère et une douleur occasionnelle durant les relations sexuelles. Elle pèse 50kg et elle a une taille de 160cm. L'examen pelvien est normal. L'échographie révèle un ovaire gauche de 2×3cm et un ovaire droit de 4×6cm. Quelle est parmi les suivantes la cause la plus probable de cette symptomatologie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Appendicite chronique B. Endométriose C. Syndrome de congestion pelvienne D. Maladie des ovaires polykystiques E. Syndrome prémenstruel 	<p>امرأة عمرها ٢٧ عاماً لم يسبق لها أن حملت، تعاني من عسر طمث وحدوث ألم أثناء المicturition، وزنها ٥٠ كغم وطولها ١٦٠ سم. فحص الحوض الطبيعي. تبين من فوق الصوت أن المبيض الأيسر 3×2 سم والمبيض اليمين 4×6 سم. أي من التالي هو السبب المرجح لهذه الحالة ؟</p> <p>A. التهاب زائدة مزمن B. انتباذ بطاني رحمي C. متلازمة احتقان الحوض D. داء ميبيضي متعدد الكيسات E. متلازمة قبل العادة الشهرية</p>
49	<p>Besides the pancreas, amylase is produced in the following organs <u>except</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Salivary glands B. Liver C. Kidney D. Fallopian tubes E. Brain <p>Outre le pancréas, l'amylase est produite par les organes suivants sauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Glandes salivaires B. Foie C. Rein D. Trompes de Fallope E. Cerveau 	<p>إلى جانب البنكرياس، ينتج الأмиلاز من كل الأعضاء التالية ما عدا :</p> <p>A. الغدد اللعابية B. الكبد C. الكلية D. أنابيب فالوب E. الدماغ</p>

50	<p>A 67 year old man who has poorly -controlled type 2 diabetes for 10 days presents with a superficial, painful, purulent ulcer on the sole of his foot associated with minor trauma from the footwear. He has no other acute signs or symptoms of illness. Which of the following pathogens is the most likely cause of the infection?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peptococcus magnus B. Staphylococcus aureus C. Escherichia coli D. Clostridium perfringens <p>Un homme age de 67 ans un diabète de type 2 qui n'est pas contrôlé pendant 10 jours se présente avec un ulcère plantaire superficiel purulente et douloureux qui a été associé à un traumatisme minime de sa chaussure. Il n'a pas d'autres signes ou symptômes aigus de sa maladie. Quel est parmi les suivants le germe le plus probablement responsable de cette infection ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peptococcus magnus B. Staphylococcus aureus C. Escherichia coli D. Clostridium perfringens 	<p>رجل عمره ٦٧ عاماً يعاني من داء سكري نمط ٢ غير مراقب منذ عشرة أيام، يشكو من تقرح قيحي ظاهر ومؤلم على كعب قدمه ويترافق مع رضحة حقيقة عند مكان ليس للحذاء. ليس لديه اشارة أخرى حادة أو أعراض مرض. أي من العوامل المحرضة التالية الأكثر ترجيحاً التي تسبب هذا الإنفلونزا؟</p> <p>A. المكورات الهضمونية العظمى B. المكورات العنقودية المذهبية C. الإشبيريشيات الكولونية D. المطثيات الحاطمة</p> <p>امرأة عمرها ٤٥ عاماً طلبت استشارة بالنسبة لتعديها وفقدانها للوزن. لقد اكتشفت سيرتها الطبية السابقة أن لديها انقطاع طمث مبكر في سن ٣٥ عاماً، فوراً بعد ولادتها لآخر طفل. أن أعراضها الآن تتضمن غثيان، امتلاء مبكر بعد تناول الوجبة، وإسهال. وهي غير مدخنة. دواءها الوحيد هو كالسيوم مع فيتامين D (٥٠٠ مغ/٤٠٠ وحدة دولية). أي من التشخيص التالي يجب أن يستبعد أولاً؟</p> <p>A. قصور غدة الكظر B. نقص نشاط درق C. داء بطيء D. ورم غدي سرطاني في البنكرياس E. فرط كالسيوم الدم</p>
51	<p>A 45 year-old woman consults you for fatigue and weight loss. You discover in her past medical history that she had early menopause at the age of 35 years, soon after giving birth to her last child. Her current symptoms include nausea, early post-prandial fullness, and diarrhea. She does not smoke. Her only medication is Calcium with Vitamin D (500 mg/400 IU). Among the following, which would be a priority to rule out?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Adrenal insufficiency B. Hypothyroidism C. Celiac disease D. Adenocarcinoma of the pancreas E. Hypercalcemia <p>Une femme agee de 45 ans vous consulte pour une fatigue et perte de poids. Vous decouvrez dans son histoire medicale passee qu'elle a eu une menopause precoce a l'age de 35 ans, et ceci apres avoir accouche son dernier enfant. Ses symptomes actuels incluent une naussee, une sensation de plenitude precoce post prandiale et diarrhee. Elle ne fume pas. Le seul medicament qu'elle est entrain de prendre est le calcium avec vitamine D (500 mg/400 IU). Parmi les diagnostics differentiels suivants, quel est celui qui doit étre exclue le premier ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Insuffisance surrenaliennne B. Hypothyroidie C. Maladie celiaque D. Adenocarcinome du pancreas E. Hypercalcémie 	<p>امرأة عمرها ٤٥ عاماً طلبت استشارة بالنسبة لتعديها وفقدانها للوزن. لقد اكتشفت سيرتها الطبية السابقة أن لديها انقطاع طمث مبكر في سن ٣٥ عاماً، فوراً بعد ولادتها لآخر طفل. أن أعراضها الآن تتضمن غثيان، امتلاء مبكر بعد تناول الوجبة، وإسهال. وهي غير مدخنة. دواءها الوحيد هو كالسيوم مع فيتامين D (٥٠٠ مغ/٤٠٠ وحدة دولية). أي من التشخيص التالي يجب أن يستبعد أولاً؟</p> <p>A. قصور غدة الكظر B. نقص نشاط درق C. داء بطيء D. ورم غدي سرطاني في البنكرياس E. فرط كالسيوم الدم</p>

52	<p>A 76 year-old man complains to his physician that for six months he has developed regularly severe abdominal pain one to two hours after eating. So bad is the pain that he is losing weight because he is afraid to eat. There is no blood in his stool. The most likely diagnosis for his problem is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Diverticulosis B. Regional enteritis C. Irritable bowel syndrome D. Mesenteric angina E. Amyloidosis <p>Un homme age de 76 ans se plaint chez son medicine que depuis 6 mois il developpe regulierement une douleur abdominale sévère et ceci une a deux heures après le repas. La douleur est tellement importante qu'il est entrain de perdre du poids car il a peur de manger. Il n'a pas de sang dans les selles. Le diagnostic le plus probable de ce probleme est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Diverticulose B. Enterite regionale C. Syndrome du colon irritable D. Angine mesentérique E. Amyloïdose 	<p>رجل عمره ٧٦ عاماً يشكو لطبيبه بأنه منذ ستة أشهر وهو يشكو من ألم بطني شديد متقطع يستمر لساعة او ساعتين بعد تناول الطعام. ان الألم سيء لدرجة انه يخسر وزناً بسبب خوفه من أن يأكل. لا يوجد دم في برازه. ان التشخيص الأكثر ترجيحاً لمشكلته هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. داء الرتوج B. التهاب الأمعاء الناجي C. متلازمة القولون المتهيج D. خناق مساريفي E. الداء التشنواني
53	<p>What are the most common causative germs in the PID (Pelvic Inflammatory Disease)?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chlamydia and Gonococcus B. E. coli and Proteus C. Klebsiella and Pseudomonas D. Staphylococcus aureus and Peptostreptococcus E. Pseudomonas and Chlamydia <p>Quels germes sont le plus fréquemment en question dans les PID (Pelvic Inflammatory Disease)?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chlamydia et Gonocoque B. E. coli et Proteus C. Klebsiella et Pseudomonas D. Staphylococcus aureus et Peptostreptococcus E. Pseudomonas et Chlamydia 	<p>ما هي اكثربالجراثيم المسؤولة عن الداء الإلتهابي الحوضي؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. المتثيرات والمكورات البنية B. الاشيبيريكيات الفولوية والمنقبلات C. الكليسللات والزوايا D. المكورات العنقودية المذهبة والمكورات العقدية الهضمونية E. الزوايا والمتثيرات
54	<p>Which one of the following test is recommended for all patients with syncope?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Echocardiography B. Electrocardiography C. 24 hour holter Monitoring D. Head -up-tilt-table testing <p>Lequel des tests suivants est recommandé pour tous les patients ayant syncope ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Echocardiographie B. Electrocardiographie C. Monitoring par holter durant 24 heures D. Un test de surelevation de la table , la tête haute 	<p>اي من الفحوصات التالية تطلب عند المرضى الذين يعانون من الغشى؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A.تخطيط صدى القلب B.تخطيط قلبي كهربائي C.المراقبة بواسطة المالتر لمدة ٢٤ ساعة D.فحص انحناء الرأس المرفوع على الطاولة

55	<p>Hypercalcemia is associated with:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Non-Hodgkin's lymphoma B. Squamous cell lung cancer C. Hodgkin's lymphoma D. Squamous cell head and neck cancer E. Hypernephroma <p>L'hypercalcémie est le plus souvent associée à :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lymphome non-Hodgkinien B. Cancer épidermoïde du poumon C. Maladie de Hodgkin D. Cancer épidermoïde de tête et cou E. Hyperméphrome 	<p>يترافق فرط كالسيوم الدم مع :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. لا هودجكين ليمفوما B. سرطان الخلايا الحرشفية في الرئة C. هودجكين ليمفوما D. سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة E. ورم كلوي كظري
56	<p>A 55 year-old man is evaluated for weakness. Over the past few months, he has noted slowly progressive weakness and cramping of the left leg. Lately, he has also had some trouble swallowing food. He is awake and alert. Findings on neurologic examination are normal except for marked atrophy with fasciculations in the muscles of both leg, hyperactive reflexes in the upper and lower extremities, a diminished gag reflex, and a positive extensor plantar response. Which of the following represents the most likely diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Cervical spondylosis B. Guillain-Barré syndrome C. Lambert-Eaton syndrome D. Vitamin B12 deficiency E. Amyotrophic lateral sclerosis <p>Un homme age de 55 ans est évalué pour une faiblesse. Durant les quelques derniers mois, il a note une faiblesse progressive et des crampes au niveau de sa jambe gauche. Dernierement il a eu des troubles à la deglutition des aliments. Il est alerte et vigile. L'examen neurologique est normal excepte pour une atrophie marquée avec fasciculation des muscles des deux jambes, des reflexes hyperactifs au niveau des extrémités supérieures et inférieures, une diminution du réflexe nauséux, et une réponse plantaire positive en extension. Quel est parmi les suivants celui qui représente le diagnostic le plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Spondylose cervicale B. Syndrome de Guillain Barre C. Syndrome de Lambert-Eaton D. Déficit en vitamine B12 E. Sclérose amyotrophique latérale 	<p>رجل عمره ٥٥ عاماً يعاني من وهن. خلال بعض الأشهر الماضية، لوحظ تطور حدوث الوهن وتشنج في الرجل السرى. مؤخراً، حصل لديه أيضاً "عسر بلع للطعام". هو مستيقظ ومتتبه. الفحص العصبى طبيعى ما عدا ضمور ملحوظ وارتفاع خزمى في عضلات الرجلين، منعكسات ذات نشاط مفرط في الأطراف العلوية والسفلى، غياب المتعكس البليومي، واستجابة إيجابية في الباسطة الأخمصية. أي من التالي يindi التشخيص الأكثر ترجحاً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. داء الفقار الرقبي B. متلازمة غوريلاين - باري C. متلازمة لامبرت - إيتون D. عوز فيتامين B12 E. تصلب جانبي ضموري

57	<p>A 40 years old man presents for incapacity of abduction of the shoulder following a direct fall. The x-rays are normal. He probably has a</p> <ul style="list-style-type: none"> A. C6 paralysis B. C7 paralysis C. C8 paralysis D. Tear of the rotator cuff <p>Un patient de 40 ans se présente pour incapacité de l'abduction de l'épaule suite à un trauma direct. Les radios sont normales. Il est probable qu'il souffre de</p> <ul style="list-style-type: none"> A. D'une paralysie de C6 B. D'une paralysie de C7 C. D'une paralysie de C8 D. D'une rupture de la coiffe des rotateurs 	<p>رجل عمره ٥٩ عاماً يشكو من عدم القدرة على تبديد كتفه بعد وقوعه مباشرة. التصوير الشعاعي طبيعي. من المحتمل أن يكون قد حدث له :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. شلل في C6 B. شلل في C7 C. شلل في C8 D. تمزق في الكففة المدوربة
58	<p>From which of the following laboratory data is it possible to differentiate between secondary and primary hypothyroidism?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. a low serum T4 level and normal TSH levels B. an elevated serum T4 level and low TSH levels C. a low serum T4 level and elevated TSH levels D. an elevated serum T4 level and elevated TSH levels <p>Parmi lesquelles des données de laboratoire suivantes il est possible de différencier entre une hypothyroïdie secondaire et une hypothyroïdie primaire ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. un taux bas de T4 sérique et un taux normal de TSH sérique B. un taux élevé de T4 sérique et un taux bas de TSH sérique C. un taux bas de T4 sérique et un taux élevé de TSH sérique D. un taux élevé de T4 sérique et un taux élevé de TSH sérique 	<p>بالاستناد إلى أي من المعلومات المخبرية التالية، يمكن التمييز بين نقص نشاط درق ثانوي ونقص نشاط درق أولي :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. مستوى T4 مصلبي منخفض ومستوى TSH طبيعي B. مستوى T4 مصلبي مرتفع ومستوى TSH منخفض C. مستوى T4 مصلبي منخفض ومستوى TSH مرتفع D. مستوى T4 مصلبي مرتفع ومستوى TSH مرتفع

59	<p>Which one of the following recommendations about antibiotics for the prevention of cold symptoms is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Antibiotics are recommended for patients with purulent nasal discharge after three to five days. B. Antibiotics are recommended to prevent pneumonia. C. Antibiotics are not recommended for patients with a suspected cold. D. Antibiotics are recommended for adults with cold and fever after three to five days. <p>Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui est exacte concernant le traitement des toux reliés à une grippe ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Les antibiotiques sont recommandés pour les patients qui ont un écoulement nasal de 3 à 5 jours B. Les antibiotiques sont recommandés pour prévenir une pneumonie C. Les antibiotiques ne sont pas recommandés pour les patients ayant une grippe suspecte D. Les antibiotiques sont recommandés pour les adultes qui ont une grippe et fièvre depuis 3 à 5 jours 	<p>أي من التعليمات التالية صحيحة بالنسبة للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج اعراض الزكام؟</p> <p>A. توصيف المضادات الحيوية بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من حدوث نسخة قيحي انفي عند المرضى</p> <p>B. توصيف المضادات الحيوية لمنع حدوث ذات رئة</p> <p>C. لا توصيف المضادات الحيوية للمرضى الذين يتوقفون حدوث زكام لهم</p> <p>D. توصيف المضادات الحيوية للكبار بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من إصابتهم بالزكام وإرتفاع الحرارة</p>
60	<p>A patient presenting with headache and a visual perception of halos around lights can be secondary to which of the following conditions?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Meningitis B. Temporal arteritis C. Acute angle glaucoma D. Venous sinus thrombosis <p>Un patient se présente pour des céphalées et une perception visuelle de Halos à la lumière, ceci peut être secondaire à laquelle des conditions suivantes ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Meningite B. Artérite temporaire C. Glaucome à angle aigu D. Thrombose du sinus veineux 	<p>إن شكوى مريض من الصداع ورؤية هالات حول الضوء، يمكن أن تكون أعراض تالية للإصابة بأي من الحالات التالية؟</p> <p>A. التهاب سحايا</p> <p>B. التهاب الشريان الصدغي</p> <p>C. زرق زاوية حاد</p> <p>D. خثار جيبي ووريدي</p>

61	<p>60 year old man. With Inguino-scrotal mass suddenly became hard , painful and irreducible with arrest of stools and gases. What is your initial diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Epididymo-orchitis B. Strangulated inguinal hernia C. Viral orchitis D. Syphilitic chancre E. Testicular Torsion <p>Homme de 60 ans. Masse inguino-scrotale ancienne devenue soudainement irréductible et douloureuse avec arrêt des matières et des gaz. Quel est votre premier diagnostic?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Orchi-épididymite B. Hernie inguinale étranglée C. Orchite virale D. Chancre syphilitique E. Torsion testiculaire 	<p>رجل عمره ٦٠ عاماً أصبحت الكتلة الإربية الصفنية له فجأة صلبة، مؤلمة ومتعرجة مع توقف البراز والغازات. ما هو التشخيص الأولي؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب البربخ والخصية B. فتق إربى مختنق C. التهاب خصية فيروسي D. قرحة السفيلي E. لوبي خصبو
62	<p>A 2 year old child is febrile to 39 degrees Celsius. A urine analysis shows: 3RBC/mm³ and culture grows 100,000 colonies of E. Coli.</p> <p>You would:</p> <ul style="list-style-type: none"> A- admit the child for acute pyelonephritis B-Start oral antibiotics for upper urinary tract infection C-Do a PPD test to eliminate a urinary tuberculosis. D-Repeat the urine culture and await the outcome. E-Repeat the urinalysis and start intravenous antibiotics. <p>Un enfant de 2 ans est fébrile à 39 degrés celsius. Un examen cytobactériologique des urines (ECBU) fait par poche montre : 3GB/mm³ et une culture qui pousse en 100000 Colonies d'E.Coli.</p> <p>Votre attitude serait :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Admettre l'enfant pour pyélonéphrite aiguë B- Commencer une antibiothérapie orale pour infection urinaire haute C- Faire une IDR à la tuberculine pour éliminer une tuberculose urinaire. D- Refaire l'ECBU et attendre le résultat. E- Refaire l'ECBU et commencer une antibiothérapie intraveineuse. 	<p>طفل عمره سنتان لديه ارتفاع حرارة ٣٩°م.</p> <p>تبين من فحص البول النتائج التالية :</p> <p>٣GB/mm³ و 100000 مستعمرة من الإشريكيات القولونية سيكون سلوكيك :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ادخال الطفل الى المستشفى بسبب التهاب كلية وحوض حاد B. البدء بمضادات حيوية لانتان المجاري البولية العلوية C. اجراء تفاعل داخل الجلد للسلين لاستبعاد داء السل البولي D. اعادة زرع البول وانتظار النتيجة E. اعادة تحليل البول والبدء بمضاد حيوي وريدي

63	<p>A 15-year-old boy with a persistent asthma that is poorly controlled on a short-acting inhaled beta2 agonist presents for routine evaluation. Which one of the following is the most appropriate next course of action?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Add a leukotriene inhibitor B. Add an inhaled corticosteroid C. Add a second -generation anti-histamine D. Add a long-acting beta2 agonist and leukotriene inhibitor <p>un garçon age de 15ans avec un asthme persistant qui est mal controlé par les agonistes beta 2 par inhalation se présente pour une evaluation de routine. Quelle est parmi les suivantes le plan d'action le plus approprié ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ajouter un inhibiteur de leukotriene B. Ajouter un corticostéroïde en inhalation C. Ajouter un antihistaminique de 2eme generation D. Ajouter un agoniste beta 2 a longue duree d'action et un inhibiteur de la leukotriene 	<p>فتى عمره ١٥ عاماً، يعاني من ربو مزمن ولا يستجيب على العلاج بمقدار بيتا ٢ استنشافي قصير الفعالية، حضر من أجل التقييم الروتيني. أي من التالي هو العمل التالي الأكثر ملائمة؟</p> <p>A. اضافة مثبط ليكوتربين B. اضافة كورتيكوسterونيد استنشافي C. اضافة مضاد هستامين جيل ثانى D. اضافة مقدار بيتا ٢ ذات فعالية مدمرة ومثبط ليكوتررين</p>
64	<p>Which one of the following recommendations about antibiotics for the treatment of URI is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Antibiotics are recommended for patients with purulent nasal discharge after three to five days B. Antibiotics are recommended to prevent pneumonia C. Antibiotics are not recommended for patients with suspected URI D. Antibiotics are recommended for adults with URI and fever after three to five days <p>Concernant les antibiotiques pour le traitement d'une infection des voies respiratoires hautes, quelle est parmi les recommandations suivantes celle qui est correcte ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. les antibiotiques sont recommandés pour les patients ayant un écoulement nasal purulente après 3 à 5 jours B. les antibiotiques sont recommandés pour prévenir une pneumonie C. les antibiotiques ne sont pas recommandés pour les patients suspects d'une infection respiratoire haute D. les antibiotiques sont recommandés pour les adultes avec une infection respiratoire haute et une fièvre après 3 à 5 jours 	<p>اي من النصائح التالية عن المضادات الحيوية اللازمة لعلاج انتان الطرق التنفسية العلوية صحيحة؟</p> <p>A. ينصح استخدام المضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من نضح انفي فيجي بعد ثلاثة أيام B. ينصح استخدام المضادات الحيوية لمنع حدوث ذات رئة C. ينصح استخدام المضادات الحيوية عند مرضى يعانون من توقيع حدوث انتان طرق تنفسية علوية D. ينصح استخدام المضادات الحيوية للكبار الذين يعانون من انتان طرق تنفسية علوية وحرارة بعد ثلاثة أيام</p>

65	<p>25 years old with motor vehicle accident and contusion on the left side of the abdomen, presents to the E.R. with pallor , cold extremities , hypotension at 8 and tachycardia at 130. What is the organ most likely injured?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Spleen B. Stomach C. Small intestine D. Rectum E. Left colon <p>Jeune de 25 ans accident de la voie publique avec contusion du côté gauche de l'abdomen, arrive aux urgences avec pâleur, froideur des extrémités, hypotension à 8 et tachycardie à 130. Quel est l'organe le plus probablement lésé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rate B. Estomac C. Intestin grêle D. Rectum E. Colon gauche 	<p>رجل عمره ٢٥ عاماً حصل له حادث مروري مع آذية في الجهة اليسرى من البطن، حضر إلى الطوارئ، وهو يعاني من شحوب، برودة أطراف، إنخفاض ضغط ٨ وتسارع قلب ١٣٠. ما هو العضو المصابة الأكثر ترجحاً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> .A. الطحال .B. المعدة .C. الامعاء الدقيقة .D. الشرج .E. القولون الأيسر
66	<p>Which of the following statements regarding hypertrophic pyloric stenosis is valid?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. the disease is manifested during the first few days of life B. metabolic acidosis is characteristic C. the disease is manifested during the first 4-6 weeks of life D. bilious vomit is a characteristic finding <p>Quelle est parmi les suivantes la proposition exacte concernant la sténose hypertrophique du pylore ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La maladie se manifeste Durant les quelques premiers jours de la vie B. L'acidose métabolique est caractéristique C. La maladie se manifeste durant les 4 à 6 premières semaines de la vie D. Des vomissements bilieux sont caractéristiques 	<p>أي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة للتضيق البواب الضخم؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. يكشف المرض خلال الأيام الأولى من الحياة B. تتصف الحالة بتحمّض استقلابي C. يكشف المرض خلال أول ٦-٤ أسابيع من الحياة D. الإقياء الصفراوي هو من مواصفاته

67	<p>A 21-year-old nulligravid woman who is not using contraception has had irregular menstrual periods since menarche at age 13 years. She has noted increased hair growth on her face and lower abdomen. On pelvic examination, there is copious cervical mucus and slightly enlarged irregular ovaries. Which of the following is the most likely cause of these findings?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Adrenal adenoma B. Idiopathic hirsutism C. Ovarian tumor D. Pituitary adenoma E. Polycystic ovarian disease <p>Une femme âgée de 21 ans nulligravide qui n'utilise pas des contraceptifs a eu des périodes menstruelles irrégulières depuis sa menarche à l'âge de 13 ans. Elle a noté une augmentation de sa pilosité au niveau de sa face et de la partie inférieure de l'abdomen. A l'examen pelvien, il existe un mucus cervical, copieux et des ovaires augmentés de volume d'une façon irrégulière. Quelle est parmi les suivantes la cause la plus fréquente de ce tableau ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Adénome surrénalien B. Hirsutisme idiopathique C. Tumeur ovarienne D. Adénome de l'hypophyse E. Maladie des ovaires polykystiques 	<p>امرأة عمرها ٢١ عاماً، لم يسبق لها ان حملت، لا تستخدم موائع حمل، تعاني من دورات شهرية غير منتظمة وذلك منذ بدء الإصابة في سن ١٣ عاماً. لقد لاحظت تزايد في نمو الشعر على وجهها وأسفل البطن. تبين من فحص الحوض، وجود مخاطية غزيرة في عنق الرحم وإن المبيض غير طبيعي ومتضخم بعض الشيء. أي من التالي هو السبب الأكثر ترجحاً؟</p> <p>A. ورم غدي كظربي B. شعرانية مجهرولة السبب C. ورم في المبيض D. ورم غدة النخامة E. داء ميopi ممتد الكيسات</p>
68	<p>50 year old man operated at the age of 15 years of peritonitis, with arrest in elimination of stools and gases with generalized abdominal pain, cramping and biliary vomiting . What is your initial diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gastroenteritis B. Occlusion of the colon C. Crohn's disease D. adhesions intestinal Occlusion E. Bowel cancer <p>Homme de 50 ans opéré à l'âge de 15 ans de péritonite appendiculaire, vient pour arrêt des matières et des gaz avec douleur abdominale généralisée à type de crampes et vomissement fécaloïdes. Quel est votre premier diagnostic?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gastroentérite B. Occlusion du colon C. Maladie de Crohn D. Occlusion intestinale par adhesion E. Cancer du grêle 	<p>رجل عمره ٥٥ عاماً، أجريت له جراحة عندما كان عمره ١٥ عاماً من أجل التهاب البريتون، يعاني من توقف التبرز وغازات مع آلم بطني معمم، تشنجات وآقياء صفراوي. ما هو تشخيصك البدني ؟</p> <p>A. التهاب معوي معدى B. انسداد القولون C. داء كروهن D. انسداد معوي بسبب التصاقات E. سرطان قولون</p>

69	<p>A 58 years old female with intense epigastric stabbing pain. Fever and hypotension. Temperature 38.3 to 39 degrees. First diagnosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gastritis B. Acute cholecystitis C. Acute pancreatitis D. Gastroesophageal reflux disease E. Hepatitis <p>Femme de 58 ans. Douleur épigastrique intense en coup de poignard. Fièvre à 38.3 et hypotension à 9. Premier diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gastrite B. Cholécystite aigue C. Pancréatite aigue D. Reflux gastro-œsophagien E. Hépatite 	<p>امرأة عمرها ٥٨ عاماً تعاني من آلم شرسوفي نافذ بشدة. حرارتها ٣٨,٣°C وضغطها منخفض بحدود ٩. التشخيص الأول :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب معدة B. التهاب مرارة حاد C. التهاب بنكرياس حاد D. داء الإرتجاع المعدى المرئي E. التهاب كبد
70	<p>Vitamin D toxicity may produce:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bone pain B. Diarrhea C. Hypercalcemia D. Hypophosphatemia E. Increase intracranial pressure <p>La toxicité de la vitamine D peut produire:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Douleurs osseuses B. Diarrhée C. Hypercalcémie D. Hypophosphatémie E. Augmentation de la pression intracrânienne 	<p>يمكن أن تؤدي سمية فيتامين D إلى :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. آلم عظمي B. اسهال C. فرط كالسيوم الدم D. نقص فوسفات الدم E. ارتفاع الضغط داخل القحف
71	<p>Which of the following laboratory tests is recommended for children classified as overweight who have no risk factors?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. A fasting lipid profile B. Aspartate transaminase and alanine transaminase C. Fasting blood sugar D. Creatinine <p>Quel est parmi les test de laboratoire suivants celui qui est recommandé pour des enfants classifiés comme ayant un excès de poids et qui n'ont pas de facteur de risque ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Profil lipidique à jeun B. SGOT et SGPT C. Glycémie à jeun D. Creatinine 	<p>أي من الفحوصات المخبرية التالية تطلب للأطفال ذات الوزن الزائد وليس لديهم عوامل مهددة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. فحص الشحوم على الريق B. اسپارتات ترانساميناز و الالاتين ترانساميناز C. فحص سكر الدم على الريق D. كرياتينين

72	<p>Which of the following is the initial imaging study recommended for the evaluation of patients with left lower quadrant abdominal pain?</p> <ol style="list-style-type: none"> CT without contrast media CT with oral contrast media CT with oral and intravenous contrast media Ultrasonography <p>Quelle est parmi les imageries suivantes celle qui est recommandee initialement pour évaluer les patients qui ont une douleur abdominale au quadrant inférieur gauche ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Scanner sans produit de contrast Scanner avec produit de contrast oral Scanner avec produit de contrast intraveineux et oral Ultrasonographie 	<p>اي من التالي هو الدراسة التصويرية البدنية المطلوبة من أجل تقييم مرضى يعانون من ألم في الربع الأسفل الأيسر من البطن ؟</p> <p>A. مسح طبقي محوري دون وسط ظليل B. مسح طبقي محوري في وسط ظليل فموي C. مسح طبقي محوري في وسط ظليل وريدي فموي D. تخطيط الصدى</p>
73	<p>The presence of red blood cell casts in the urinary sediment is suggestive of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acute hemorrhagic cystitis Glomerulonephritis Adenovirus cystitis Acute prostatitis Pyelonephritis <p>La présence de cylindres hématiques dans le sédiment urinaire suggère :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cystite hémorragique Glomérulonéphrite Cystite à Adénovirus Prostatite aigue Pyélonéphrite 	<p>يقترن وجود كريات حمراء في راسب بولي :</p> <p>A. التهاب كيسة نزفية حادة B. التهاب كلوي كبيبي C. التهاب كيسة فيروسي غدي D. التهاب بروستات حاد E. التهاب الحويضة والكلية</p>
74	<p>The test of choice for immediate evaluation of an acutely swollen scrotum is</p> <ol style="list-style-type: none"> a pelvic radiograph radionuclide imaging color Doppler ultrasonography CT scan MRI <p>Le test de choix pour évaluer rapidement un gonflement scrotal aigu est :</p> <ol style="list-style-type: none"> Radiographie pelvienne Une scintigraphie Ultrason avec Doppler couleur CT scan IRM 	<p>ان الفحص المختار للتقييم المباشر لتضخم صفن حاد هو :</p> <p>A. تخطيط شعاعي حوضي B. تصوير بالنوكليد المشع C. تخطيط الصدى الدوبلري الملون D. مسح طبقي محوري E. تصوير رنين مغناطيسي</p>

75	<p>Which is the most likely toxicity associated with excessive doses of theophylline?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bradycardia B. Drowsiness then coma C. Hepatotoxicity D. Paradoxical bronchospasm E. Seizures <p>Quelle est la toxicité la plus probablement associée à des doses excessives de théophylline ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bradycardie B. Somnolence puis coma C. Hépatotoxicité D. Bronchospasme paradoxal E. Convulsions 	<p>ما هي السمية الأكثر ترجحاً المترافق مع جرعة زائدة من التيوفيللين ؟</p> <p>A. تباطؤ قلب B. دوخة ثم غيبوبة C. سمية كبدية D. تشنج فصبي تنافضي E. نوب احتلاجية</p>
76	<p>In the management of hypercalcemia, the following measure should be avoided:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Intravenous Furosemide B. Thiazide diuretics C. Saline infusions D. Intravenous bisphosphonates E. Intravenous calcitonin <p>Dans la conduite à tenir devant une hypercalcémie, quelle est la mesure que vous devriez éviter ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Furosemide en intraveineux B. Diurétiques thiazidiques C. Infusions de serum sale D. Biphosphonates en intraveineux E. Calcitonine en intraveineux 	<p>أي من التالي يجب تجنبه عند معالجة فرط كالسيوم الدم ؟</p> <p>A. فيوروسيميد وريدي B. مدرات التيازيد C. محليل التلقيم الملحي D. بيزفوسفونات وريدي E. كالسيتونين وريدي</p>
77	<p>Which one of the following initial findings is most useful for excluding a diagnosis of giant cell arteritis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Normal sedimentation rate B. Normal complete blood count C. Normal examination of the temporal artery D. Normal eye examination <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui est le plus utile pour exclure un diagnostic d'artérite à cellule géante ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Vitesse de sedimentation normale B. Numération formule normale C. Examen normal de l'artère temporaire D. Examen normal des yeux 	<p>أي من المعايير التالية تفيد أكثر في استبعاد تشخيص التهاب الشريان ضخم الخلايا ؟</p> <p>A. معدل ترسيب طبيعي B. تعداد كريات دم كامل طبيعي C. فحص الشريان الصدغي طبيعي D. فحص عين طبيعي</p>

78	<p>Antibiotics used in the neonatal period should have the following characteristics except one, which one?</p> <p>A-Be bacteriostatic; B-Pass strongly through the dura C-Do not be toxic to the newborn; D-To give intravenously; E-be the cheapest possible.</p> <p>Les Antibiotiques utilisés en période néonatale doivent avoir les caractéristiques suivantes sauf une, laquelle?</p> <p>A- Etre bactériostatiques; B- Pouvoir traverser les méninges; C- Ne pas être toxiques pour le nouveau-né; D- Se donner par voie intraveineuse; E- Etre le moins chers possible.</p>	<p>يجب على المضادات الحيوية التي تعطى لحديثي الولادة ان تتمتع بجميع المواصفات التالية ما عدا :</p> <p>A. ان تكون موقفة لنمو الجراثيم B. ان تمر بقرة عبر الحاجة C. ان لا تكون سمية لحديث الولادة D. ان تعطى وريدياً E. ان تكون منخفضة الثمن قدر المستطاع</p>
79	<p>A 62-year-old female presents with acute breathlessness of one hour duration. She smokes occasionally. On examination, she is sweaty and needs to sit up, has oxygen saturations of 89% on air, a temperature of 37.5°C and has a respiratory rate of 30/min. Auscultation of the chest reveals widespread expiratory wheezes and extensive bilateral basal crackles. Which ONE of the following is the SINGLE MOST likely diagnosis?</p> <p>A. Asthma B. Pneumonia C. Pulmonary embolism D. Pulmonary fibrosis E. Pulmonary edema</p> <p>Une femme âgée de 62 ans se présente pour un essoufflement aigu et qui dure depuis une heure. Elle fume occasionnellement. A l'examen, elle transpire et a besoin de se mettre debout, elle a une saturation d'oxygène à 89% à l'air libre, une température de 37.5°C et a une fréquence respiratoire de 30/min. L'auscultation du thorax révèle des wheezings expiratoires espacés et des crépitants extensifs basaux bilatéraux. Quelle est parmi les suivantes le seul diagnostic le plus probable ?</p> <p>A. Asthme B. Pneumonie C. Embolie pulmonaire D. Fibrose pulmonaire E. Oedeme pulmonaire</p>	<p>امرأة عمرها ٦٢ عاماً تعاني من قصور تنفس حاد منذ ساعة. هي مدخنة عادة. عند إجراء الفحص تبين أنها متعرقة وتحتاج إلى أن تبقى جالسة، إشباع الأوكسجين ٨٩٪، درجة حرارتها ٣٨،٥°C ومعدل التنفس ٣٠/د. أظهر التسريع الصدري أزيز تنفسى منتشر وكراكر سفلية ثنائية الجانب شديدة. أي من التالي هو التشخيص الوحيد الأكثر ترجيحاً ؟</p> <p>A. ربو B. ذات الرئة C. انصمام رئوي D. تليف رئوي E. وذمة رئوية</p>

80	<p>A 28 year-old patient is seeking medical advice because of incidental finding of a 3 cm right adrenal mass by CT scan that was done for a benign GI reason few weeks ago. The patient is asymptomatic, does not have history of malignancy, is not hypertensive, does not have Cushing features. What will you do next for this patient?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Reassure B. Follow-up with CT scan after 6 months C. Pheochromocytoma should be ruled out D. Surgical resection E. FNA of the tumor <p>Un homme age de 28 ans cherche un avis medical a cause d'une decouverte fortuite d'une masse surrenaliennne de 3cm sur un CTscan qui a ete pratique pour un probleme gastrointestinal beginin et ceci depuis quelques semaines. Le patient est asymptomatique, il n'a aucune histoire de malignite, il n'est pas hypertendu, et il n'a pas de signe de cushing. Quest-ce que vous faites comme prochaine etape chez ce patient ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rassurer le patient B. Suivi du patient avec un CTscan après 6 mois C. Un pheochromocytome doit etre exclus D. Resection chirurgicale E. Ponction biopsie de la tumeur 	<p>مريض عمره ٢٨ عاماً يطلب نصيحة طبية بسبب حجم غدة الكظر اليمنى الذي شوهد بأنه يصل إلى ٣ سم بالمسح الطيفي المحوري الذي أجري من أجل التحري عن امر حميد بالجهاز الهضمي. لا يشكو المريض من اعراض، وليس لديه سيرة مرضية بالإصابة بخبانة، ليس لديه ارتفاع ضغط، وليس لديه معلم كوشين. ما هي الخطوة التالية التي يجب اتخاذها لهذا المريض ؟</p> <p>.A. اعادة التأكيد .B. المتابعة بعمل مسح طيفي محوري بعد ٦ أشهر .C. يجب استبعاد ورم القواتم .D. استئصال جراحي .E. رشف بالإبرة الدقيقة للورم</p>
81	<p>EKG signs of hyperkalemia include all of the following, except:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Diminished or absent P waves B. Peaked T waves C. Prolonged P-R interval D. Prominent U waves E. Widened QRS complex <p>Les signes electrocardiographiques d'une hyperkaliémie incluent tous ce qui suit SAUF :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Diminution ou absence des ondes P B. Des ondes T pointues C. Interval P-R prolongé D. Des ondes U proéminentes E. Elargissement du complexe QRS 	<p>يتضمن علامات التخطيط الكهربائي للقلب لانخفاض بوتاسيوم الدم كل ما يلي ما عدا ؟</p> <p>P. غياب موجات A Mوجات T عالية B P-R. طول الفترة ما بين C Mوجات U بارزة D معقد QRS واسع E</p>
82	<p>Which one of the following is NOT a complication of hysteroscopy ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gas embolism B. Hypernatremia C. Uterine perforation D. Fluid overload <p>Des propositions suivantes quelle est celle qui n'est pas une complication de l'hysteroscopie :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Embolie gazeuse B. Hypernatrémie C. Perforation utérine D. Hyperhydratation 	<p>اي من التالي هو ليس من مضاعفات تنظير الرحم :</p> <p>A. انصمام هواني B. فرط صوديوم الدم C. انقلاب رحمي D. تحمل زائد للسائل</p>

83	<p>perinatal infection (all of the following are true except one):</p> <ul style="list-style-type: none"> A- in a male predilection; B-accompanied, in most cases, with fever; C-Can raise the serum C-reactive protein; D-is sometimes preceded by a maternal infection status; E-Not a specific symptomatologie <p>L'infection périnatale (toutes les propositions suivantes sont justes sauf une):</p> <ul style="list-style-type: none"> A- A une prédilection au sexe masculin; B- S'accompagne, le plus souvent, de fièvre; C- Peut éléver la Protéine C-réactive sérique; D- Est parfois précédée d'un état infectieux maternel; E- N'a pas une symptomatologie spécifique. 	<p>كل ما يلي صحيح بالنسبة للإنتان المحيط بالولادة ما عدا :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. يميل بشكل اكبر للذكر B. يتراافق، في معظم الحالات، مع حرارة C. يمكن ان يرتفع من معدل البروتين المتفاعله D. في بعض الأحيان يكون مسبوقاً بإصابة انتانية عند الام E. هو ليس مبحث اعراض نوعي
84	<p>Acute aortic dissection should be suspected in a patient with:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Anterior chest pain B. Interscapular pain C. Diastolic hypertension with an aortic insufficiency murmur D. All of the above E. None of the above <p>Une dissection aigue de l'aorte est suspectée en cas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Douleur thoracique antérieure B. Douleur interscapulaire C. Hypertension diastolique avec un souffle d'insuffisance aortique D. Toutes sont justes E. Aucune n'est juste 	<p>يجب توقع حدوث تسلخ ابهري حاد عند مريض يعاني من :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ألم صدرى أمامي B. ألم ما بين الكتفين C. ارتفاع ضغط انبساطي مع نفخة قصور أبهري D. كل الأجروبة اعلاه صحيحة E. كل الأجروبة اعلاه غير صحيحة
85	<p>Bacterial vaginosis is best treated with:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mebendazole B. Tetracycline C. Metronidazole D. Cefuroxime E. Penicillin <p>Une vaginite bacterienne est le mieux traitée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mebendazole B. Tetracycline C. Metronidazole D. Cefuroxime E. Penicilline 	<p>ان افضل علاج لإصابة مهبلية جرثومية هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ميبندازول B. تتراسيكلين C. مترونيدازول D. سفيرووكسيم E. بنسللين

86	<p>A patient has to undergo splenectomy for hereditary spherocytosis. Which of the following immunizations is indicated prior to that?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mumps vaccination B. Pneumococcal vaccination C. Measles vaccination D. BCG (Bacillus Calmette-Guérin) E. Tetanus toxoid <p>Un jeune homme doit subir une splénectomie pour sphérocytose héréditaire. Laquelle des vaccinations suivantes est indiquée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Oreillons B. Pneumococcique C. Rougeole D. BCG (Bacillus Calmette-Guérin) E. Tétanos 	<p>اضطرر مريض لإجراء عملية استئصال طحال بسبب كثرة الكريات الحمراء الكروية الوراثي. أي من اللقاحات التالية يجب وصفه قبل العملية؟</p> <p>A. لقاح التكافف B. لقاح ذات الرئة C. لقاح الحصبة D. لقاح السل (عصيات كلمنت - غورين) E. لقاح الكلاز</p>
87	<p>All the following viruses may be responsible for mononucleosis except:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Epstein Barr virus B. Adenovirus C. Human immunodeficiency virus D. Cytomegalovirus E. Rubella virus <p>Lequel des virus suivants n'est pas associé avec une mononucléose?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Virus d'Epstein Barr B. Adénovirus C. Virus de l'immunodéficience humaine D. Cytomégalovirus E. Virus de la rubéole 	<p>كل الفيروسات التالية يمكن ان تكون مسؤولة عن انتان وحيدات النوع ما عدا :</p> <p>A. فيروس ايشتاين بار B. فيروس الغدية C. فيروس نقص المناعة البشرية D. فيروس الخلايا العرطلة E. فيروس الحصبة الألمانية</p>
88	<p>A pulsatile abdominal mass is discovered during a routine examination of a 62 year-old woman with hypertension. Ultrasonography reveals an aortic aneurysm diameter of 3.5cm. Which one of the following actions is the best next step?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Yearly ultrasonography B. Referral to a vascular surgeon C. Immediate surgical repair of the abdominal mass D. No further testing is required <p>Une masse abdominale pulsatile est découverte durant un examen de routine chez une femme âgée de 62 ans ayant une hypertension artérielle. L'échographie révèle un anévrisme aortique de 3.5cm de diamètre. Quelle est la meilleure action parmi les suivantes à faire :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Echographie annuelle B. Referer la patiente chez un chirurgien vasculaire C. Réparation chirurgicale immédiate de cette masse abdominale D. Aucun test supplémentaire est nécessaire 	<p>اكتشف وجود كتلة بطنية محبوسة خلال الفحص الروتيني لإمرأة عمرها ٦٢ عاماً تعاني من ارتفاع ضغط. اظهر تخطيط الصدى ام دم ابهري بقطر ٣،٥ سم. اي من التالي هو الإجراء المفضل؟</p> <p>A. تخطيط صدى سنوي B. مراجعة طبيب اختصاصي في جراحة الأوعية C. معالجة جراحية فورية للكتلة البطنية D. غير مطلوب اجراء فحوصات أخرى</p>

89	<p>Tout ce qui suit est cohérent avec le diagnostic de migraine sauf</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Céphalées fluctuantes et intermittentes B- Céphalées sévères et continues C- Céphalées battantes D- Histoire positive de céphalées en famille E- Bonne réponse à l'aspirine <p>All of the following are consistent with the diagnosis of migraine except</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Fluctuating and intermittent headache B- Severe, continuous headache C- Pounding headache D- Positive family history of headache E- Good response to Aspirin 	<p>كل ما يلي متناسك مع تشخيص الشقيقة ما عدا</p> <ul style="list-style-type: none"> A- صداع متقطع ومتناول B- صداع شديد ومتواصل C- صداع بشدة (يدق بعنف) D- سيرة عائلية لصداع E- استجابة للاسيبرين
90	<p>Perianal pain with defecation and sitting down associated to fever. First diagnosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Anal abscess B. Hemorrhoids C. Anal fistula D. Perianal condyloma E. Anal fissure <p>Douleur péri-anale constante à la défécation et à la position assise avec fièvre. Premier diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Abcès anal B. Hémorroïdes C. Fistule anale D. Condylome péri-anal E. Fissure anale 	<p>المحيط بالشرج مع كل تبرز وجلوس، مترافق بحرارة. التشخيص الأول :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. خراج شرجي B. بواسير C. ناسور شرجي D. ورم لقمي حول الشرج E. شق شرجي
91	<p>All the following urolithiasis are radioopaque <u>except</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Cystine stones B. Calcium oxalate stones C. Struvite stones D. Urate stones E. Calcium phosphate stones <p>Les calculs urinaires suivants sont radioopiques <u>sauf</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Calculs de cystine B. Calculs d'oxalate de calcium C. Calculs de struvite D. Calculs d'urate E. Calculs de phosphate de calcium 	<p>الحصيات البولية التالية هي ظليلة على الأشعة ما عدا</p> <ul style="list-style-type: none"> A. حصيات سستين B. حصيلات اكسالات الكالسيوم C. حصيات ستروفيت D. حصيات اورات E. حصيات فسفات الكالسيوم

92	<p>A 32-year-old woman is diagnosed to have Trichomonas. She is entirely asymptomatic. Appropriate management should be to</p> <ul style="list-style-type: none"> A. reassure patient that no treatment is necessary B. treat regardless of symptoms C. repeat cultures after the next menstrual cycle and treat if the organism is present D. treat only if the patient is pregnant E. treat only if symptoms are present <p>Une femme âgée de 32 ans est diagnostiquée comme ayant du Trichomonas. Elle est complètement asymptomatique. La conduite à tenir appropriée doit être :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rassurer la patiente qu'aucun traitement n'est nécessaire B. Traiter sans tenir compte des symptômes C. Répéter la culture après le cycle menstruel prochain et traiter si l'organisme est présent D. Traiter seulement si la patiente est enceinte E. Traiter seulement si les symptômes sont présents 	<p>امرأة عمرها ٣٢ عاماً، تم تشخيص اصابتها بالمشعرة. لا تعاني من أعراض. ان التدبير العلاجي المناسب هو :</p> <p>A. التأكيد للمربيضة بأنه لا يوجد ضرورة للمعالجة</p> <p>B. المعالجة بغض النظر عن الأعراض</p> <p>C. إعادة الزرع بعد العادة الشهرية التالية و معالجة الإصابة إن وجدت</p> <p>D. المعالجة فقط في حالة اذا كانت المريضية حامل</p> <p>E. المعالجة فقط اذا وجدت الاعراض</p>
93	<p>In the case of hypospadias, what intervention is absolutely contraindicated:</p> <ul style="list-style-type: none"> A- perform VCUG (vesico -urethral cystography) B- Make a circumcision C-Make an abdominal ultrasound D-Do a urine culture E-Operate before 18 months <p>Devant un hypospadias, quel est le geste absolument à ne pas faire:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Faire une cystographie rétrograde B. Faire une circoncision C. Faire une échographie abdominale D. Faire une uroculture E. Proposer l'opération avant 18 mois 	<p>بالنسبة للميال الثنائي، اي من التالي يجب عدم فعله مطلقاً ؟</p> <p>A-تصوير مثانى حالي</p> <p>B-اجراء ختان</p> <p>C-اجراء فوق الصوت للبطن</p> <p>D-اجراء زرع بول</p> <p>E-اجراء عملية قبل ١٨ شهراً</p>

94	<p>Which one of the following statements about treatment of nonalcoholic fatty liver disease is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Metformin (Glucophage) reduces hepatic transaminase levels and improves ultrasound findings B. Metformin reduces the likelihood of progression to cirrhosis C. Metformin reduces cardiovascular mortality D. Metformin reduces all-cause mortality <p>Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui est exacte concernant le traitement de la surcharge graisseuse non alcoolique du foie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Metformine (Glucophage) réduit le taux des transaminases hépatiques et améliore les trouvailles à l'échographie B. Metformine réduit la possibilité de la progression vers la cirrhose C. Metformine réduit la mortalité cardiovasculaire D. Metformine réduit toute cause de mortalité 	<p>أي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة لمعالجة داء كبدی دسم غير كحولي ؟</p> <p>A. يخفض المتفورمين (الغلوكوفاج) من مستويات الترانساميناز الكبدية ويهسن من الكشف بفوق الصوت</p> <p>B. يخفض المتفورمين من تطور التشمع الكبدی</p> <p>C. يخفض المتفورمين من معدل الوفيات بالاصابة القلبية الوعائية</p> <p>D. يخفض المتفورمين كل أسباب الوفيات</p>
95	<p>35 year-old female patient, smoking, with hypertension and a personal medical history of right leg phlebitis. She asks for the best means of contraception. What method do you recommend?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Contraceptive pill B-Female condom C- IUD (Intra Uterine Device) D- Progesterone implant E-Vaginal Ring <p>Femme de 35 ans, tabagique, hypertendue avec antécédents de phlébites des MI se présente pour contraception. Quel moyen lui recommandez-vous ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pilule B. Préservatif féminin C. Stérilet D. Implant de progestérone E. Anneau vaginal 	<p>гине 35 лет, курильщица, с гипертонией и персональной медицинской историей правой ноги флегмона. Она просит о лучшем способе контрацепции. Какой метод вы рекомендуете?</p> <p>A. Презерватив B. Женский презерватив C. ГИД (внутриутробный контрацептив) D. Имплант прогестерона E. Вагинальное кольцо</p> <p>Женщина 35 лет, курильщица, гипертоник, с анамнезом флегмона правой ноги. Принесла на прием для консультирования о контрацепции. Какой метод вы рекомендуете?</p> <p>A. Плакал B. Женский презерватив C. Стерилет D. Имплант прогестерона E. Вагинальное кольцо</p>
96	<p>Which of the following maternal conditions is a contraindication to breast feeding?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Status post reduction mammography B. Hepatitis C carrier status C. Mastitis D. Active herpes lesions on the breast <p>Quelle est parmi les conditions maternelles suivantes celle qui est une contreindication à l'allaitement ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Statut de mamographie après une chirurgie de reduction B. Statut de porteur d'Hépatite C C. Mastite D. Lesions d'herpes active au niveau du sein 	<p>أي من حالات الأمومة التالية هي مضاد استطباب للرضاعة ؟</p> <p>A. حالة تالية لتصوير ثدي شعاعي B. حالة الحمل لإلتهاب الثدي فيروسي ٢ C. التهاب الثدي D. آفات هيربس نشطة على الثدي</p>

97	<p>A 9-year-old girl presents for acute pain for 2 hours in the left iliac fossa with nausea. An ultrasound done showed an enlarged left ovary.</p> <p>What is your first diagnosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> A-A diverticulitis B-An ectopic pregnancy C-Torsion of the ovary D-Acute appendicitis with intestinal malrotation E-A neuroblastoma <p>Une fille âgée de 9 ans se présente pour douleur aiguë depuis 2 heures à la fosse iliaque gauche avec nausées. Une Echographie faite a montré un ovaire gauche augmenté de volume.</p> <p>Quel est votre premier diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Une diverticulite B- Une grossesse extra-utérine C- Une torsion de l'ovaire D- Une appendicite aiguë sur malrotation intestinale E- Un neuroblastome 	<p>فتاة عمرها 9 سنوات تشكو من ألم حاد منذ ساعتين في الحفرة المرققية اليسرى مع غثيان. تبين من فوق الصوت وجود تضخم في المبيض الأيسر. ما هو التشخيص الأول؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب رتج B. حمل خارج الرحم C. لوبي مبيضي D. التهاب زائدة مع سوء التغاف معوي E. ورم أرومي عصبي
98	<p>Visual field defect involving loss of vision in the lateral half of both eyes is due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lesion involving the temporal lobe B. Lesion involving the occipital lobe C. Lesion of the parietal lobe D. Pituitary tumor E. Bilateral optic neuritis <p>Un déficit de champ visuel intéressant les champs externes des deux yeux est du à :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lésion du lobe temporal B. Lésion du lobe occipital C. Lésion du lobe pariétal D. Tumeur hypophysaire E. Névrite optique bilatérale 	<p>ان العيب في الحقل البصري والذي يتضمن فقدان الرؤية في النصف الجانبي من كلتا العينين يعود الى :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. آفة تصيب الفص الصدغي B. آفة تصيب الفص القذالي C. آفة في الفص الجداري D. ورم نخامي E. التهاب عصب بصري ثانوي الجانب

99	<p>A 38 year old female patient, P1P0A0, obese, currently pregnant at 36weeks of amenorrhea + 2d, twin pregnancy, has a considerable increase the last two days of her leg edema with an intense epigastric pain in bar. What would you do?</p> <p>A-Reassure the patient: the leg esema is normal during pregnancy and prescribe Gastrimut B- Make an hemoglucotest C-Measure BP, proteinuria, CBC, complete liver function, fibrinogen and an urgent C-section D-Vaginal delivery E- Prescribe diuretics</p> <p>Patiante de 38 ans, G1P0A0, obèse, actuellement enceinte à 36 semaines d'aménorrhée + 2j, grossesse gémellaire, présente depuis 2 jours une augmentation considérable de ses Oedèmes des Membres inférieurs(OMI) accompagnée d'une douleur épigastrique en barre intense. Quelle est la démarche à suivre ?</p> <p>A. Rassurer la patiente : les OMI c'est normal durant la grossesse et prescrire un pansement gastrique B. Faire une glycémie C. Mesurer TA, faire une protéinurie, avec FNS, bilan hépatique complet, fibrinogène et césariser en urgence D. Accouchement voie basse E. Prescrire des diurétiques</p>	<p>امرأة عمرها ٣٨ عاماً، P1P0A0 بدينة، حامل ٣٦ أسبوعاً + يومين بتوأم، حدث لها زيادة ملحوظة في وذمة رجلها منذ يومين، مع الم شرسوفي شديد. ما هو الإجراء الأفضل ؟</p> <p>A. طمئنة المريضة : وذمة الرجل طبيعية خلال الحمل ووصف الغاستريموت B. اجراء فحص سكر الدم C. قياس الضغط، بيلة البروتين، تعداد كريات الدم، كامل وظيفة الكبد، مولد الفيبرين، واجراء جراحة قيسارية عاجلة D. ولادة مهبلية E. وصف مدرات بولية</p>
100	<p>You receive at your consultation a pregnant woman in the 4th month for a urinary tract infection without fever. The urine culture grows with E. Coli Multi sensitive. Which of these antibiotics do you prescribe?</p> <p>A-Spiramycin B-Norfloxacin C-Ceftazidime D-Ciprofloxacin E-Amoxicillin</p> <p>Vous recevez à la consultation une femme enceinte au 4^{eme} mois pour une infection urinaire sans fièvre. L'ECBU pousse en E. Coli multi sensible. Lequel de ces antibiotiques lui prescrivez-vous ?</p> <p>A. Spiramycine B. Norfloxacine C. Ceftazidime D. Ciprofloxacine E. Amoxicilline</p>	<p>حضرت امرأة حامل في شهر الرابع وهي تعاني من انتان طرق بولية بدون حرارة. أظهر زرع البول نمو ايشرييكيات قولونية ذات حساسية متعددة. أي من المضادات الحيوية التالية يجب ان يوصف ؟</p> <p>A. سبيراميسين B. نورفلوكساسين C. سفتازيديم D. سبيروفلوكساسين E. اموكسيسيلاين</p>

101	<p>A 82 years old woman under oral anticoagulation for atrial fibrillation presenting with Diffuse abdominal pain for two hours with bloody diarrhea. First diagnosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gastroenteritis B. Hemorrhoids C. Intestinal obstruction D. Mesenteric ischemia E. Irritable bowel <p>Femme de 82 ans sous anticoagulation orale pour fibrillation auriculaire. Douleur abdominale diffuse depuis 2 heures violente avec diarrhée sanguinolente.</p> <p>Premier diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gastroentérite B. Hémorroïdes C. Occlusion intestinale D. Ischémie mésentérique E. Colon irritable 	<p>امرأة عمرها 82 عاماً تعالج بمضاد وتخثر فموي بسبب رجفان أذيني، حضرت وهي تشكو من آلم بطني منشر منذ ساعتين مع إسهال مدمى. التشخيص الأول :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب معدى معوي بواسير B. انسداد معوي C. افقار مساريفي D. متلازمة فولون متهدج
102	<p>An elderly patient with hypertension who presents with a lateral medullary stroke would be expected to have all of the following EXCEPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Contralateral Babinski sign B. Ipsilateral Horner's sign C. Ipsilateral cerebellar abnormality D. Vertigo E. Loss of pain and temperature sensation on contralateral side of the body and ipsilateral side of face <p>Un patient âgé ayant hypertension qui se présente pour un accident vasculaire bulbaire, vous attendez à avoir tout ce qui suit sauf :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Signe de Babinski contralatéral B. Signe de Horner ipsilatéral C. Une anomalie ipsilatérale cérébelleuse D. Vertige E. Une perte une sensation de la température et de la douleur du côté contralatéral du corps et du côté ipsilatéral de la face 	<p>مريض كبير في السن يعاني من ارتفاع ضغط، اصيب بسكتة منخية جانبية. يجب توقع كل ما يلي ما عدا :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. علامة بابinski بالجانب المقابل B. علامة هورنر بنفس الجانب C. تشوه مخيخي بنفس الجانب D. دوخة E. فقدان الإحساس بالألم والحرارة بالجانب المقابل للجسم وبنفس الجانب للوجه

103	<p>Which of the following inflammatory conditions is most likely to lead to a pyogenic liver abscess?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Cholangitis/cholecystitis B. Diverticulitis C. Endocarditis D. Inflammatory bowel disease E. Perforated appendix <p>Quelle maladie inflammatoire est la plus probablement associée Avec la formation d'abcès hépatiques?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Angiocholite/cholécystite B. Diverticulite C. Endocardite D. Maladie inflammatoire de l'intestin E. Appendicite perforée 	<p>أي من الحالات الالتهابية التالية هي الأكثر ترجيحاً لكي تؤدي إلى الإصابة بخراج كبدي فيجي؟</p> <p>A. التهاب قناة الصفراء/التهاب المرارة B. التهاب الرتوج C. التهاب شغاف القلب D. داء القولون المتفجر E. زيادة متفوقة</p>
104	<p>Which of the following infectious agents is most highly associated with anal carcinoma?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Adenovirus B. Epstein Barr virus C. Herpes simplex virus D. Human papilloma virus E. Human herpes virus 8 <p>Lequel des virus suivants est le plus associé à un carcinome anal?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Adenovirus B. Epstein Barr virus C. Herpes simplex virus D. Human papilloma virus E. Human herpes virus 8 	<p>أي من العوامل الانتانية التالية تترافق بشكل كبير مع كرسينوما شرجية؟</p> <p>A. فيروس العدنة B. فيروس إبشتاين بار C. فيروس الحلاع البسيط D. فيروس الورم الحليمي البشري E. فيروس الحلاع البشري</p>
105	<p>A 30 year-old female presents with 2 days of headache, fever, seizure and confusion. On exam there is weakness on one side of the body and stiff neck. The CSF shows 20 WBC's, 10 RBC's with normal sugar and protein. The MRI of brain reveals a mass effect with edema in the temporal lobe. The most likely diagnosis is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Herpes simplex encephalitis B. HIV with brain lymphoma C. Septic embolus secondary to endocarditis D. Brain tumor <p>Une femme agee de 30 ans se presente pour une cephalee, fievre, convulsion et confusion depuis 2 jours. A l'examen il existe une faiblesse du corps unilateral et une raideur de la nuque. Le liquide céphalorachidien montre 20 globules blancs et 10 globules rouges avec une glycorachie et une proteinorachie normale. L'IRM cerebral revele un effet de masse avec oedeme au niveau du lobe temporal. Le diagnostic le plus probable est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Encephalite a herpes simplex B. HIV avec lymphome cerebral C. Embolie septique secondaire a une eondocardite D. Tumeur cerebrale 	<p>امرأة عمرها ٣٠ عاماً تشكو من صداع، حرارة، نوبات وخلط ذهني منذ يومين. تبين من الفحص وجود ضعف في جانب واحد من الجسم ورقبة متيسسة. أظهرت السائل النخاعي ٢٠ كريات حمراء سكر وبروتين طبيعي. تبين من التصوير الرنيني المغناطيسي وجود كتلة مؤثرة مع وذمة في الفص الصدغي. ان التشخيص الأكثر ترجيحاً هو :</p> <p>A. اعتلال دماغي جراء الإصابة بالحلاع البسيط B. مع ورم لمفي دماغي HIV. C. صمة انتانية تالية لالتهاب شغاف القلب D. ورم دماغي</p>

106	<p>Which of the following findings is the strongest indication for imaging in patients with acute low back pain?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Failure to respond to conservative therapy after two to three weeks B. Bilateral leg weakness C. Sciatica in one leg D. Positive result on leg raising <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui est l'indication la plus forte pour investiguer en imagerie un patient ayant une douleur lombaire basse ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Echec de la réponse au traitement conservateur après 2 ou 3 semaines B. Faiblesse bilatérale des deux jambes C. Sciaticalgie au niveau de la jambe D. Résultat positif en soulevant la jambe 	<p>اي من التالي هو من الدواعي القوية للتصوير عند مرضى يعانون من ألم حاد في أسفل الظهر؟</p> <p>A. فشل الاستجابة بعد أسبوع لأسبوعين من المعالجة التحفظية</p> <p>B. ضعف في الرجلين</p> <p>C. عرق النساء في رجل واحدة</p> <p>D. نتيجة إيجابية عند رفع الرجل</p>
107	<p>In the evaluation of dizziness, a true statement is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Acute vestibular neuritis is the most common cause for dizziness B. Once vertigo is diagnosed the next step is to determine whether the cause is peripheral or central C. Labyrinthitis is similar to acute vestibular neuronitis D. History usually does not reveal the diagnosis <p>Dans l'évaluation d'un vertige, quelle est la proposition exacte :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La névrite vestibulaire aiguë est la cause la plus fréquente du vertige B. Quand un vertige est diagnostiqué l'étape suivante est de déterminer si la cause est centrale ou périphérique C. La labyrinthite est identique à la neuronite vestibulaire aiguë D. L'histoire ne révèle pas habituellement le diagnostic 	<p>لتقييم الدوخة، العبارة الصحيحة هي :</p> <p>A. ان التهاب العصب الدهليزي الحاد، هو السبب الأكثر شيوعاً للدوخة</p> <p>B. ان الخطوة بعد تشخيص الدوار هي معرفة اذا كان السبب محظي او مركز</p> <p>C. ان التهاب التي مشابه لالتهاب العصب الدهليزي الحاد</p> <p>D. ان السيرة المرضية عادة لا تساعد على التشخيص</p>

108	<p>A 53-year-old woman has been hypertensive for the past 5 years. She is on hydrochlorothiazide 50 mg daily. On examination, her blood pressure is 130/80 mm Hg. The apex cannot be felt. What is the most sensitive investigation to assess left ventricular hypertrophy in this patient?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Plain chest X-ray postero-anterior view B. Plain chest X-ray lateral view C. Resting electrocardiogram D. Exercise electrocardiogram E. Transthoracic echocardiography <p>Une femme âgée de 53 ans a été hypertendue Durant les 5 dernières années. Elle est sous hydrochlorothiazide 50mg par jour. A l'examen, sa pression artérielle est de 130/80mmHg. On n'arrive pas à palper l'apex. Quelle est l'investigation la plus sensible pour évaluer l'hypertrophie ventriculaire gauche chez cette patiente?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Une radiographie simple du thorax incidence antéropostérieur B. Une radiographie simple du thorax en lateral C. Electrocardiogramme au repos D. Electrocardiogramme à l'effort E. Echocardiographie transthoracique 	<p>امرأة عمرها ٥٣ عاماً تعاني من ارتفاع ضغط ممتد ٥ سنوات. تعالج ببهدروكلورتيازيد ٥٠ مجم يومياً. تبين من الفحص ان ضغطها الدموي ١٣٠/٨٠ مم زئبق. القمة غير محسوسة. ما هو التحري الحساس الأفضل لتأكيد حدوث تضخم البطين الأيسر عند هذه المريضة؟</p> <p>A. صورة أشعة عادية خلفية - أمامية للصدر B. صورة أشعة عادية جانبية للصدر C. تخطيط قلب كهربائي عند الراحة D. تخطيط قلب كهربائي بعد التمارين E. تخطيط صدى القلب بطريق الصدر</p>
109	<p>Which of the following risk factors predicts the highest risk of developing breast cancer?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mother with breast cancer B. Nulliparity C. BRCA-1 or BRCA-2 mutation D. Age >55 E. Biopsiy-proven lobular carcinoma in situ <p>Quel est parmi les facteurs de risqué suivants celui qui prédit le risque le plus haut de développer un cancer du sein</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Une mere ayant un cancer du sein B. Nulliparite C. Mutation du BRCA-1 ou BRCA-2 D. Age supérieur à 55 ans E. Carcinome lobulaire in situ prouvé par biopsie 	<p>أي من العوامل المهددة التالية تنبأ بخطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي؟</p> <p>A. أم تعاني من سرطان ثدي B. عدم القدرة على الإنجاب C. طفرة BRCA-1 و BRCA-2 D. عمر فوق ٥٥ E. سرطان فصيسي الموضع مثبت بجزءة</p>

110	<p>A 67-year-old woman presents with acute severe back pain. On examination she looks pale. There is no localized tenderness of the spine. Bone profile showed the following:</p> <p>Calcium 2.9 mmol/l (2.2-2.6) Phosphate 2.2 mmol/l (0.8-1.2) Alkaline phosphatase 126 iu/l (50-150)</p> <p>Which ONE of the following is the SINGLE most likely underlying diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Hyperparathyroidism B. Metastases C. Multiple myeloma D. Osteoporosis E. Sarcoidosis <p>Une femme âgée de 67 ans se présente avec une douleur sévère et aigue au niveau du dos. A l'examen elle paraît pâle. Il n'existe pas de douleur localisée au niveau de la colonne vertébrale. Le profile osseux montre :</p> <p>Calcium 2.9 mmol/l (2.2-2.6) Phosphate 2.2 mmol/l (0.8-1.2) Phosphatase Alkaline 126 iu/l (50-150)</p> <p>Quel est parmi les suivants le seul diagnostic le plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Hyperparathyroïdie B. Metastases C. Myélome multiple D. Osteoporose E. Sarcoidose 	<p>امرأة عمرها ٦٧ عاماً تعاني من آلم في الظهر شديد حاد. بدت شاحبة أثناء الفحص. لا يوجد إيلام متوضع للنخاع. المشهد العظمي أظهر التالي :</p> <p>كالسيوم ٢،٩ ملي مول/لتر (٢،٢-٢،٦) فوسفات ٢،٢ ملي مول/لتر (٠،٨-١،٢) الفوسفاتاز القلوية ١٢٦ وحدة دولية/لتر (٥٠-١٥٠)</p> <p>أي من التالي هو التشخيص الوحيد الأكثر ترجيحاً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. فرط نشاط جارات الدرق B. نقيلة C. ورم نفقي متعدد D. هشاشة عظام E. ساركوم
111	<p>A 55-year-old woman who was diagnosed to have colonic diverticula on a computed tomography. She is currently asymptomatic and is presenting to your clinic for counseling.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. More than half of patients with diverticula develop GI malignancy B. Colonic diverticula result in bleeding in the stool C. She should increase the fiber content of her diet D. Prophylactic antibiotics should be given to prevent diverticulitis <p>Une femme âgée de 55 ans qui a été diagnostiquée comme ayant une diverticulose chronique sur le CTscan est actuellement asymptomatique et se présente à votre clinique pour un conseil.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Plus que 50% des patients qui ont des diverticules développent une malignité du tractus gastrointestinal B. Les diverticules coliques donnent une hémorragie dans les selles C. Elle doit augmenter le contenu de fibre dans sa diète D. Les antibiotiques prophylactiques doivent être donnés pour éviter la diverticulite 	<p>امرأة يبلغ عمرها ٥٥ عاماً ، وقد شخص لها رتوج قولونية بواسطة التصوير المقطعي. هي لا تعاني من أعراض وقد حضرت للعيادة من أجل الاستشارة :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. أكثر من نصف المرضى الذين يعانون من الرتوج يحدث لديهم اورام خبيثة هضمية B. ينتج عن الرتوج القولوني تزيف دموي في البراز C. يجب أن تزيد من محتوى الألياف في نظام غذائها D. يجب اعطاء المضادات الحيوية للوقاية من التهاب الرتوج

112	<p>The drug of choice for an elderly patient who has Akinesia (slowness in his motor activity), a resting tremor and cogwheel rigidity is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Aspirin anticoagulation B. Anti-cholinergic agents C. Dopamine D. Dopamine Agonists E. L-Dopa <p>Quel est parmi les suivants, le medicament de choix pour un patient age qui a une akinesie (ralentissement de son activite motrice), un tremblement au repos et une rigidite a la marche :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Anticoagulation a l'aspirine B. Agents anticholinergiques C. Dopamine D. Agonistes de la dopamine E. L-Dopa 	<p>ان الدواء المختار لعلاج مريض مسن يعاني من تغدر الحركة، رعشة عند السكون، وصمل متقطع هو :</p> <p>A.اسيبرين B.عوامل مضادة للكلولين C.دوبيامين D.مقدات دوبامين E. دوبا</p>
113	<p>A 20 year-old previously healthy man presents to the emergency room with a history of fever, headaches and dry cough of 3 days duration. Physical examination was only remarkable for a temperature of 39.5°C. Blood pressure, respiratory rate and lung exam were normal. Chest X-Ray revealed right and left lower lobe infiltrates. Your options for treatment include all the following except:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Oral clarithromycin B. Oral doxycycline C. Oral erythromycin D. Oral levofloxacin E. Intravenous ceftriaxone <p>Un homme age de 20 ans qui est auparavant en bonne sante se presente aux urgences avec une histoire de fievre, cephalee et toux seche et ceci depuis 3 jours. L'examen physique n'est remarquable que pour une temperature de 39.5°C. la pression arterielle, la frequence respiratoire et l'examen des poumons sont normaux. La radiographie du thorax revele des infiltrats lobaires droite et gauche. Votre option therapeutique inclue tout ce qui suit sauf :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Clarithromycin oral B. Doxycycline oral C. Erythromycine orale D. Levofloxacin oral E. Ceftriaxone en intraveineux 	<p>رجل عمره ٢٠ عاماً يتمتع بصحة جيدة، حضر الى غرفة الطوارئ وهو يعاني منذ ٣ أيام من حرارة، صداع وسعال جاف. اظهر الفحص السريري ارتفاع حرارة بدرجة ٣٩.٥°C. ضغط الدم، معدل التنفس والرئة طبيعية. تبين من صورة الصدر الشعاعية وجود رشاحات في الفص السفلي الأيمن والأيسر. تتضمن خيارات العلاج كل ما يلي ما عدا :</p> <p>A.كلاريثروميسين فموي B.دووكسي سيللين فموي C.اريترومايسين فموي D.ليفوفلوكساسين فموي E.سفترياكسون وريدي</p>

114	<p>In a patient presenting with pharyngitis, which of the following is not consistent with Streptococcus pyogenes infection?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fever B. Tonsillar exudates C. Lymphadenopathy D. Odynophagia E. Hoarseness <p>Un patient qui se présente avec une pharyngite, quelle est parmi les suivantes celle qui ne va pas avec une infection à streptocoque pyogène ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fièvre B. Exsudat au niveau des amygdales C. Lymphadenopathie D. Odynophagie E. Enrouement de la voix 	<p>عند مريض مصاب بالتهاب البلعوم، أي من التالي هو ليس من اعراض انتان المكورات العقدية المقيدة ؟</p> <p>A. الحرارة B. نسخ لوزي C. اعتلال غدد لمفاوية D. بلع مؤلم E. البحة</p>
115	<p>Which of the following joint is never affected by gout?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Metatarso-phalangeal joint B. Knee joint C. Hip joint D. Interphalangeal joints E. Intervertebral joints <p>Quelle articulation n'est jamais atteinte dans la goutte ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Articulation métatarso-phalangienne B. Genou C. Hanche D. Articulations interphalangiennes E. Articulations intervertébrales 	<p>أي من المفاصل التالية لا يصاب أبداً بالنقرس ؟</p> <p>A. المفصل المشطي السلامي B. مفصل الركبة C. مفصل الورك D. المفاصل ما بين السلاميات E. المفاصل ما بين الفقرات</p>
116	<p>Which of the following is the most common form of cancer affecting the skin?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Basal cell carcinoma B. Squamous cell carcinoma C. Malignant melanoma D. Cutaneous T cell lymphoma E. Metastatic lung cancer <p>Quelle est parmi les suivantes la forme la plus fréquente du cancer atteignant la peau?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Carcinome baso cellulaire B. Carcinome spino cellulaire C. Melanome malin D. Lymphome cutané à cellule T E. Metastase du cancer pulmonaire 	<p>أي من التالي هو الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الجلد ؟</p> <p>A. سرطان الخلايا القاعدية B. سرطان الخلايا الحرشفية C. ورم ميلانيني خبيث D. ليغفروما خلايا T الجلدية E. سرطان رئة نقلبي</p>

117	<p>A biliary-enteric fistula most frequently connects the gallbladder with the</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Duodenum B. Jejunum C. Stomach D. Hepatic flexure of the colon <p>Une fistule entero biliaire relie le plus frequemment la vesicule biliaire au</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Duodenum B. Jejunum C. Estomac D. Angle colique hépatique 	<p>ان الناسور المعوي - الصفراوي يمكن ان يربط المرارة بـ :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. الاثني عشرري B. الصائم C. المعدة D. الزاوية الفولونية الكبدي
118	<p>Which one of the following antibiotics would be an appropriate single-dose treatment for patients with gonorrhea?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Penicillin B. Tetracycline C. Trimethoprim-sulfamethoxazole D. Ceftriaxone <p>Quel est parmi les antibiotiques suivants celui qui est un traitement approprié d'une dose unique chez les patients ayant une gonorrhée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Penicilline B. Tétracycline C. Triméthoprime-sulfaméthoxazole D. Céftriaxone 	<p>اي من المضادات الحيوية التالية يمكن ان تكون مناسبة كجرعة علاجية واحدة للمرضى الذين يعانون من السيلان البنى ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. بنسللين B. تتراسكالين C. تريميتوبريم - سلفاميبوكسازول D. سفترياكسون
119	<p>Which of the following is the most common cause of male factor infertility?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ejaculatory duct obstruction B. Primary hypogonadism C. Secondary hypogonadism D. Testicular tumor E. Prader-willi syndrome <p>Quel est parmi les suivants la cause la plus fréquente du facteur d'infertilité chez les hommes?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Obstruction du canal ejaculatoire B. Hypogonadisme primaire C. Hypogonadisme secondaire D. Tumeur testiculaire E. Syndrome de Prader-willi 	<p>اي من التالي هو السبب الأكثر شيوعا" للعقم عند الرجال ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. انسداد القناة الدافقة B. قصور الغدد التناسلية الأولى C. قصور الغدد التناسلية الثانية D. ورم في الخصية E. متلازمة برادر - ويلي

120	<p>Within these antibiotics, which one doesn't have effect on the <i>Bacteroides fragilis</i>?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Clindamycin B. Cefoxitin C. Aztreonam D. Chloramphenicol E. Imipenem <p>Quel est parmi ces antibiotiques, celui qui n'a aucune action sur le <i>Bactéroidès fragilis</i> ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Clindamycine B- Cefoxitine C- Aztréonam D- Chloramphénicol E- Imipénème 	<p>أي من المضادات الحيوية التالية ليس لديه تأثير على العصوانيات الهشة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. كلينداميسين B. سفوكتين C. ازتريونام D. كلورامفينيكول E. أميبينام
121	<p>A 65-year-old man presents with the complaint of hard swelling in his distal inter-phalangeal joints in both hands for few months. On physical exam the lesions are hard and not tender. A true statement about this finding is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. This man has osteoarthritis B. Carry the Lachman's test to confirm your diagnosis C. D. Request a bone densitometry E. X-ray of the hands is advised at this point <p>Un homme âgé de 65 ans se plaint de gonflement dur au niveau des articulations interphalangiennes distales au niveau des deux mains et ceci depuis plusieurs mois. A l'examen les lesions sont dures mais indolore. Quelle est la proposition exacte concernant ceci :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Cet homme a une ostéoarthrite B. Faire le test de Lachman pour confirmer votre diagnostic C. Demander une densitométrie osseuse D. Une radiographie des deux mains est à conseiller à ce niveau 	<p>رجل عمره ٦٥ عاماً يشكو من انتفاخ قاسي في نهايات مفاصل أصابع يديه منذ عدة أشهر. تبين من الفحص السريري أن هذه الآفات قاسية وليست مؤلمة. إن العبارة الصحيحة لهذه الحالة هي :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. هذا الرجل يعاني من فصال عظمي B. اجراء فحص كاري ولاشمان لتأكيد التشخيص C. طلب اجراء قياس كثافة العظم D. ينصح بإجراء صورة أشعة لليدين في هذه الحالة

122	<p>A 6-hour-old newborn exhibits tachypnea and dyspnea and vomits repeatedly. The body temperature of the newborn is normal. The physical examination reveals a tympanic resonance over the left side of the chest, no respiratory sounds are audible over this side. The surface of the abdomen is concave. What is the most likely cause of this condition?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. congenital valvular disease B. neonatal sepsis C. left-sided pneumonia D. a diaphragmatic hernia on the left side E. pneumothorax <p>Un nouveau-né âgé de 6 heures présente une tachypnée et une dyspnée et vomit à répétition. La température de son corps est normale. L'examen physique révèle une résonance tympanique au niveau de la partie gauche du thorax, les murmures vesiculaire ne sont pas audibles à ce niveau. L'abdomen est concave. Quelle est la cause la plus probable de ce tableau ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Maladie congenital valvulaire B. Un sepsis neonatal C. Une pneumonie gauche D. Une hernie diaphragmatique gauche E. Pneumothorax 	<p>حدث ولادة عمره 6 ساعات يبدي شرخ نفسي، صفيق تنفس وإقياء متكرر. درجة حرارة جسمه طبيعية. أظهر الفحص السريري رنين طبلي فوق الجانب الأيسر من الصدر، لا يوجد أصوات تنفسية مسموعة فوق هذا الجانب. إن سطح البطن مقعر. ما هو السبب الأكثر ترجيحاً لهذه الحالة؟</p> <p>A. داء صمامي خلفي B. انتان وليدي C. ذات رئة بالجانب الأيسر D. فتق حجابي في الجانب الأيسر E. استرواح الصدر</p>
123	<p>The most important predictor of survival after surgery for advanced ovarian cancer is :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Presence of ascites B. Histologic grade C. Type of chemotherapy used D. Volume of tumor remaining after surgery <p>Le facteur le plus important qui prédit la survie après chirurgie pour cancer ovarien est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Présence d'une ascite B. Grade histologique C. Type de chimiothérapie utilisé D. Volume de la tumeur résiduelle après la chirurgie 	<p>ان المؤشر الاكثر أهمية للبقاء على قيد الحياة بعد عملية جراحية لسرطان مبيض متقدم هو :</p> <p>A. وجود استسقاء B. درجة الفحص النسجي C. نوع العلاج الكيميائي المستخدم D. حجم الورم المتبقى بعد العملية الجراحية</p>
124	<p>Which of the following is the recommended initial therapy for viral pleurisy?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Opiate analgesics B. Colchicine C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs D. Acetaminophen <p>Quelle est parmi les suivantes le traitement initial recommandé en cas de pleurésie virale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Analgésie aux opiacés B. Colchicine C. Antiinflammatoire non stéroïdien D. Acetaminophène 	<p>اي من التالي مطلوب كعلاج بدئي لالتهاب الجنب الفيروسي؟</p> <p>A. مسكنات أفيونية B. كولشيسين C. مضادات التهاب غير ستيروئيدية D. أسيتامينوفين</p>

125	<p>Which of the following entities is most associated with severe pneumococcal sepsis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Multiple myeloma B. Acute myelogenous leukemia C. Non-Hodgkin lymphoma D. Small cell carcinoma of the lung E. Gastric carcinoma <p>Laquelle des conditions suivantes est le plus classiquement associée avec une septicémie à pneumocoques sévère ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Myélome multiple B. Leucémie myéloïde aigüe C. Lymphome non-Hodgkinien D. Carcinome pulmonaire à petites cellules E. Carcinome gastrique 	<p>أي من التالي يترافق مع انتان مكورات رئوية شديد؟</p> <p>A. ورم نفوي متعدد B. ابيضاض دم نفوي حاد C. لا Hodgkinين ليمفوما D. كارسينوما صغيرة الخلايا في الرئة E. كارسينوما معدية</p>
126	<p>Among patients with chronic kidney disease, metformin (Glucophage) generally is recommended for which one of the following groups?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Patients with chronic heart failure B. Men with serum creatinine level of 1.5mg/dl or lower C. Patients older than 80 years D. Patients with severe infection <p>Parmi les patients ayant une maladie rénale chronique, la metformine (glucophage) généralement est recommandée pour lequel des groupes suivants ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Patients ayant une insuffisance cardiaque chronique B. Les hommes ayant un taux de créatinine égale à 1,5mg/dl ou inférieur C. Les patients ages de plus que 80 ans D. Patient qui présente une infection sévère 	<p>من ضمن المرضى الذين يعانون من داء كلوي مزمن، لأي من المجموعات التالية يعطى الميتفورمين (جلوکوفاج) ؟</p> <p>A. مرضى يعانون من قصور قلبي مزمن B. رجال لديهم كرياتينين المصل ١،٥ مع/دل او أقل C. مرضى أكبر من ٨٠ عاماً D. مرضى يعانون من انتانات شديدة</p>
127	<p>A patient is brought to the emergency department because of a suicidal attempt by ingesting massive doses of aspirin. Which of the following would be helpful in managing this patient?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Acetaminophen B. Amphetamines C. N-Acetylcysteine D. Phenobarbital E. Sodium bicarbonate <p>Un patient est amené aux urgences après une ingestion suicidaire massive d'aspirine. Quel serait utile dans son traitement?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Paracétamol B. Amphétamines C. N-acétylcystéine D. Phénobarbital E. Bicarbonate de soude 	<p>احضر مريض الى غرفة الطوارئ. بسبب محاولته الانتحار عن طريق ابتلاعه لجرعات كبيرة من الأسبرين . اي من التالي يمكن ان يساعد في تدبير هذا المريض ؟</p> <p>A. اسيتامينوفين B. امفيتايين C. N-استيل سيستيتين D. فينوباربital E. ثالث فحمات الصوديوم</p>

128	<p>At her 6-week postpartum visit, a 21-year-old woman, gravida 1, para 1, tells her physician that she has a pinkish vaginal discharge that has persisted since her delivery, although it is decreasing in amount. On physical examination, the uterus is fully involuted, and there are no adnexal masses. Which of the following is the most appropriate next step in management?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Administer ampicillin B. Order a quantitative beta-HCG test C. Order a serum prolactin measurement D. Reassure the patient that this is normal E. Schedule a dilatation and curettage <p>A sa visite 6 semaine en post partum, une femme âgée de 21 ans, gravida 1, para 1, raconte à son médecin qu'elle a un écoulement vaginal violace qui persiste depuis son accouchement, et qui diminue en quantité. A l'examen physique, l'utérus est complètement en involution, et il n'existe pas de masse adnexielle. Quelle est parmi les suivantes l'étape la plus appropriée dans la conduite à tenir ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Administrer de l'ampicilline B. Demander un test quantitatif de beta-HCG C. Demander un taux de prolactine sérique D. Rassurer la patiente que tout est normal E. Prévoir une dilatation et un curetage 	<p>في الأسبوع السادس التالي للولادة، امرأة عمرها 21 عاماً، حامل لأول مرة، بارا 1، أخبرت طبيبها بأنها تعاني من نضخ مهني زهري اللون مستمر منذ الولادة، بالرغم من تناقص كميتها. تبين من الفحص السريري أن هناك أوب رحمي ولا وجود لكتل ملتحقة. أي من التالي هو الخطوة التالية المناسبة في التدبير العلاجي ؟</p> <p>A. اعطاء أمبیسلین B. اجراء اختبار بيتا HCG C. اجراء معايرة لبرو لاكتين المصل D. التأكيد للمربيضة بأن هذا الأمر طبيعي E. الإعداد للتوصيع والكشف</p>
129	<p>The most serious complication of casting and splinting is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Thermal injuries to the skin B. Compartmental syndrome C. Bacterial and fungal infections D. Pruritic dermatitis E. Joint stiffness due to immobilization <p>La complication la plus sérieuse du platre et de la mise en place d'attelle est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Traumatisme thermique au niveau de la peau B. Syndrome du compartiment C. Infection bactérienne et fongique D. Dermatite prurigineuse E. Raideur de l'articulation due à l'immobilisation 	<p>ان المضاعفات الأكثر جدية الناتجة عن القربة والتجبير هي ؟</p> <p>A. اصابة حرارية للجلد B. متلازمة الحيز C. انتانات فطرية وجرثومية D. التهاب جلدي حاد E. تصلب المفصل الناتج عن التثبيت</p>

130	<p>In a young man presenting for dyspnea, physical exam reveals near absent lower extremities pulses. The most likely diagnosis is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Arteriosclerosis B. Coarctation of the aorta C. Takayasu aortitis D. Cocaine use E. Ergotamine derivative use for migraine <p>Chez un jeune homme se présentant pour dyspnée, l'examen physique révèle l'absence de pouls aux membres inférieurs. Le diagnostic le plus probable est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Artérosclérose B. Coarctation de l'aorte C. Aortite de Takayasu D. Utilisation de cocaïne E. Utilisation de dérivés de l'ergotamine pour migraine 	<p>تبين من الفحص السريري لشاب يعاني من ضيق نفس، شبه غيب لنبض الأطراف السفلية. ان التشخيص الأكثر ترجيحاً هو :</p> <p>A. تصلب شريانى B. تضيق الأبهى C. التهاب ابهى لتاكايسو D. استخدام الكوكائين E. استخدام مشتقات الارغوتامين للصداع النصفي</p>
131	<p>Which one of the following findings suggests foreign body aspiration?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Wheezing that occurs bilaterally B. Chronically ill appearance C. Sudden onset of wheezing D. Nighttime coughing <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui suggère une aspiration de corps étranger ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Wheezing qui se produit des deux cotés B. Malade qui paraît malade d'une façon chronique C. Début soudain de wheezing D. Toux nocturne 	<p>اي من المظاهر التالية تقترب وجوب اجراء شفط لجسم غريب ؟</p> <p>A. ازيز شانى الجانب B. ظهور مرض مزمن C. بدء مفاجئ للأزيز D. سعال ليلى</p>
132	<p>Which one of the following is an adverse effect of alpha blockers?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Increased incidence of prostate cancer B. Increased incidence of high-grade prostate cancer C. Orthostatic hypotension D. Ejaculatory dysfunction <p>Laquelle parmi les suivantes est l'effet secondaire des alpha bloqueurs ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Incidence augmentée de cancer prostatique B. Incidence augmentée de cancer prostatique de haut grade C. Hypotension orthostatique D. Dysfonctionnement éjaculatoire 	<p>اي من التالي هو أثر جانبى ل拮抗劑ات الألفا ؟</p> <p>A. ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان بروستات B. ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان بروستات ذات درجة عالية C. انخفاض توتر انتصابي D. خلل في وظيفة الدفق</p>

133	<p>Transmission of perinatal infection is done in several ways (all propositions are true except one)</p> <p>A-Way transcordonale; B-road ascending through fetal membranes ruptured prematurely; C- Inhalation to the fetus of maternal genital secretions soiled; D-The use of forceps for fetal extraction; E-At a neonatal resuscitation with possible insertion of prostheses.</p> <p>La transmission de l'infection périnatale se fait selon plusieurs voies (toutes les propositions sont justes sauf une)</p> <p>A- Voie transcordonale ; B- Voie ascendante à travers des membranes fœtales rompues prématurément ; C- Inhalation par le fœtus de sécrétions génitales maternelles souillées ; D- L'utilisation de forceps pour une extraction fœtale ; E- Lors d'une réanimation néonatale avec insertion éventuelle de prothèses.</p>	<p>يحدث انتقال الالتبان في الفترة المحيطة بالولادة بعدة طرق. (كل الأجوبة التالية صحيحة ما عدا) :</p> <p>A. عبر الحبل السري B. طريق صاعدي عبر الأغشية الجنينية المتمزقة غير الناضجة C. استنشاق الجنين لإفرازات الأم التناسلية D. استخدام الملقظ لسحب الجنين E. انعاش حديث الولادة بإحتمال ادخال اجهزة اجهزة</p>
134	<p>Several patients present at your clinic simultaneously, with symptoms occurring 2-3 hours after a meal. Their complaints include malaise, nausea and vomiting although they have no fever. Which of the following food-poisonings is the likely cause of this condition?</p> <p>A. Botulism B. Salmonellosis C. Staphylococcal food poisoning D. Clostridium perfringens food poisoning E. Campylobacter</p> <p>Plusieurs patients se présentent en même temps à votre clinique, pour des symptômes qui sont apparus deux à trois heures après un repas. Leurs plaintes comprennent des malaises, des nausées et des vomissements mais pas de fièvre. Quelle est parmi les intoxications alimentaires suivantes celle qui est la cause de cette présentation ?</p> <p>A. Botulisme B. Salmonellose C. Intoxication alimentaire à staphylocoque D. Intoxication alimentaire à clostridium perfringens E. Campylobactere</p>	<p>حضر الى عيادتك عدة مرضى بشكل متالي، يشكون من اعراض حدثت بعد ٣-٢ ساعات من تناول الوجبة. تتضمن شكاهم، التعب والغثيان والإقياء بالرغم من عدم وجود حرارة. اي من التسممات الغذائية التالية يمكن ان تكون السبب لهذه الحالة ؟</p> <p>A. تسمم وشيقى B. السلمونيلا C. التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية D. التسمم الغذائي بالمطثيات الحاطمة E. المتفوست</p>

135	<p>All the following diseases may be associated with diarrhea except:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Addison's disease B. Hyperparathyroidism C. Hyperthyroidism D. Medullary thyroid carcinoma E. Pheochromocytoma <p>Laquelle des maladies suivantes n'est pas associée à une diarrhée?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Maladie d'Addison B. Hyperparathyroïdie C. Hyperthyroïdie D. Carcinome médullaire de la thyroïde E. Phéochromocytome 	<p>كل الأمراض التالية يمكن ان تترافق مع اسهال ما عدا؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. داء اديسون B. فرط نشاط جارات الدرق C. فرط نشاط الدرق D. كارسينوما في لب الدرق E. ورم القوائم
136	<p>Which of the following is considered as a contraindication for surgery in lung cancer?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Involvement of the diaphragm B. Extension to the chest wall C. Invasion of the superior vena cava D. Invasion of the pericardium E. All of the above <p>Laquelle est une contreindication chirurgicale dans le cancer du poumon?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Invasion du diaphragme B. Extension à la paroi thoracique C. Invasion de la veine cave supérieure D. Invasion du péricarde E. Toutes 	<p>اي من التالي يعتبر مضاد استطباب جراحي في سرطان الرئة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. اجتياح القص الصدري B. التمدد الى الجدار الصدري C. اكتساح الوريد الأஜوف العلوي D. اكتساح التامور E. كل الأجبوبة أعلاه صحيحة
137	<p>A 60 year old female patient presents to your clinic with right knee pain which you diagnosed as osteoarthritis. Which one of the following treatment modalities is the most effective?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Arthroscopic surgery B. Steroid injections C. Knee braces D. Chondroitin supplements <p>Un femme agee de 60 ans se presente a votre clinique avec une douleur du genou droit vous diagnostiquez comme etant une arthrose. Quelle est parmi les modalites des traitements suivants celle qui est la plus efficace ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chirurgie arthroscopique B. Injection steroidienne C. Contention du genou D. Supplément de chondroïtine 	<p>امرأة عمرها ٦٠ عاماً حضرت إلى العيادة وهي تشكو من آلم في الركبة اليمنى وشخص لها فضال عظمي. اي من أنظمة العلاج التالية هي الأكثر فعالية؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. تنظير مفصلي جراحي B. الحقن الستيروئيدي C. سناد الركبة D. متممات الكوندرويتين

138	<p>Which of these skin lesions is specific for lupus erythematosus?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Raynaud's Syndrome B- Livedo C- Urticaria D- Necrotic purpura E- Discoid lupus <p>Laquelle de ces lésions dermatologiques est spécifique du lupus érythémateux disséminé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Syndrome de Raynaud B- Livédo C- Urticaire D- Purpura nécrotique E- Lupus discoïde 	<p>أي من الإصابات الجلدية التالية تعتبر نوعية للذئبة الحمامية ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. متلازمة رينود B. تزرق C. شرى D. فرفورية نخرية E. ذئبة قرصية الشكل
139	<p>Splenomegaly is present in :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Aplastic anemia B. Multiple myeloma C. Primary myelofibrosis D. Thalassemia minor E. Sickle cell anemia in the adult <p>La splénomégalie est présente dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Anémie aplastique B. Myélome multiple C. Myélofibrose primitive D. Thalassémie mineure E. Anémie falciforme de l'adulte 	<p>توجد ضخامة الطحال في :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. فقر الدم اللاتسجي B. ورم نقي متعدد C. تليف نقي بدني D. نالاسيميا صغرى E. فقر دم منجلي عند الكبار
140	<p>Which of the following drugs is the first-line treatment for post-partum hemorrhage?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Oxytocin B. Methergonovine C. Carboprost D. Misoprostol <p>Quel est parmi les médicaments suivants celui qui est le premier traitement d'une hémorragie en post-partum :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Oxytocin B. Methergonovine C. Carboprost D. Misoprostol 	<p>أي من الأدوية التالية هي خط العلاج الأول للنزيف بعد الولادة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. اوكتوكوسين B. ميترجونافين C. كاربوبروست D. ميزوبروستول

141	<p>A 40-year-old woman who presents to your clinic with a bad headache since two days. It began suddenly with a severe headache. There are no neurological signs noted. You tell her that you need to refer her for an investigation in the hospital. She asks you what investigation will be done. Which ONE of the following is the SINGLE BEST diagnostic investigation?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. CT scan B. EEG C. Lumbar puncture T1 D. MRI E. Skull X Ray <p>Une femme âgée de 40 ans se présente à votre Clinique pour une céphalée intense depuis 2 jours. Et qui a commencé subitement par une céphalée sévère. Il n'existe pas de signe neurologique. Vous lui dites que vous avez besoin de la referer pour investigation dans un hôpital. Elle vous demande quelle sorte d'investigation devrait être faite. Quelle est parmi les suivantes la seule meilleure investigation diagnostique à faire ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. CT scan B. EEG C. Ponction lombaire au niveau de T1 D. IRM E. Radiographie du crane 	<p>امرأة تبلغ من العمر ٤٠ عاماً تعاني من صداع سيء منذ يومين وقد بدأ فجأة بشكل صداع شديد. لم يلاحظ اشارات عصبية. لقد نصحتها بتحويلها إلى المستشفى من أجل إجراء تحريات، وكان سؤالها ما هي التحريات التي سوف تجري. أي من التالي هو التحري التشخيصي الوحيد الأفضل؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. مسح طيفي محوري B. تخطيط كهربائي للدماغ C. بزل قطني T1 D. تصوير رنيني مغناطيسي E. صورة أشعة للرأس
142	<p>Which of the following disorders is an indication for lithium therapy?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Panic attacks B. Schizophrenia C. Obsessive-compulsive disorder D. Bipolar disorder E. Anxiety <p>Parmi les situations suivantes, laquelle est une indication pour un traitement au Lithium?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Attaques de panique B. Schizophrénie C. Désordre obsessive compulsif D. Syndrome bipolaire E. Anxiété 	<p>أي من الإضطرابات التالية هي من دواعي المعالجة باللثيوم؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. نوبات رعب B. انفصام شخصية C. اضطراب الوسواس القهري D. اضطراب ثنائي القطب E. قلق

143	<p>The most common differential diagnosis of myocardial infarction is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pericarditis and pleuritis B. Gastroesophageal disease such as reflux or esophageal motility disorders C. Pulmonary embolism D. Ruptured aortic aneurysm E. Herpes zoster <p>Le diagnostic différentiel le plus fréquent d'un infarctus du myocarde est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Péricardite et pleurésie B. Pathologie gastro-oesophagienne tel un reflux ou des troubles moteurs oesphagiens C. Embolie pulmonaire D. Rupture d'anévrysme de l'aorte E. Zona 	<p>ان التشخيص التفريقي الأكثر شيوعاً لاحتشاء العضلة القلبية هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التهاب التامور والتهاب الجنبة B. داء معدى مريئي مثل الإرتجاع او اضطرابات حركية مريئية C. انصمام رئوي D. ام دم ابهرية متزقة E. داء الحماق المنطفي
144	<p>Lower endoscopic evaluation is recommended in which of the following groups of patients with iron deficiency anemia with no obvious benign cause?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Men under 50 B. Premenopausal women C. Postmenopausal woman D. Infants and children <p>Une evaluation endoscopique basse est recommandée dans quel groupe de patients parmi les suivants et ayant une anémie avec déficit en fer sans aucune cause évidente ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Homme âgé moins de 50 ans B. Femme en prémenopause C. Femme en postmenopause D. Enfants et bébé 	<p>لأي من مجموعات المرضى التالية يطلب تقييم تنظيري داخلي سفلي، مع العلم من أنهم يعانون من فقر دم بعوز الحديد بدون سبب حميد معروف ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. الرجال تحت الخمسين B. النساء قبل إنقطاع العادة الشهرية C. النساء بعد إنقطاع العادة الشهرية D. الأطفال والأولاد
145	<p>What is the most common cause of death in people with untreated hypertension?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Coronary disease B. Cerebrovascular accident C. Renal failure D. Hypertensive encephalopathy E. Cancer <p>La cause la plus fréquente de mortalité chez des personnes ayant une hypertension non contrôlée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Maladie coronarienne B. Accident cérébrovasculaire C. Insuffisance rénale D. Encéphalopathie hypertensive E. Cancer 	<p>ما هو السبب الأكثر شيوعاً للموت عند أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط دموي غير معالج ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. داء اكليلي B. حادث وعائي دماغي C. قصور كلوي D. اعتلال دماغي ناتج عن ارتفاع الضغط E. سرطان

146	<p>The most common cause of eosinophilia in developing countries is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Drug allergy B. Respiratory allergy C. Parasitosis D. Infection E. Asthma <p>La cause la plus commune d'hyperéosinophilie dans les pays en voie de développement est:</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Allergie médicamenteuse B- Allergie respiratoire C- Parasitose D- Infection E- Asthme 	<p>ان السبب الأكثر شيوعاً لزيادة الحامضات الدموية في البلدان النامية هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. التحسس الدوائي B. التحسس النفسي C. الإصابات الطفيلية D. الإنفلونزا E. الربو
147	<p>You receive at your consultation a 75 year-old woman who is vomiting since 3 days with signs of dehydration. Her arterial blood gases showed: pH 7.45, pCO₂ = 45 mm Hg; Bicarbonates = 35 mmol / l. This is a:</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Respiratory alkalosis B- Respiratory acidosis C- Metabolic alkalosis D- Metabolic acidosis E- Mixed alkalosis <p>Vous recevez à la consultation une femme de 75 ans pour des vomissements depuis 3 jours avec des signes de déshydratation. Ses gaz du sang montrent: pH= 7,45; pCO₂= 45 mm Hg; Bicarbonates= 35 mmoles/l. Il s'agit d'une:</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Alcalose respiratoire B- Acidose respiratoire C- Alcalose métabolique D- Acidose métabolique E- Alcalose mixte 	<p>امرأة عمرها ٧٥ عاماً تعاني منقياء منذ ٣ أيام مع مظاهر تجفاف. اظهر غاز الدم الشرياني :</p> <p>pH 7.45, pCO₂ = 45 mm Hg; Bicarbonates = 35 mmol / l.</p> <p>هذا هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. تقلون تنفسى B. تحمضن تنفسى C. تقلون استقلابي D. تحمضن استقلابي E. تقلون مختلط
148	<p>The following chemicals may be associated with thrombocytopenia except :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Alcohol B. Aspirin C. Sulfonamides D. Heparin E. Methotrexate <p>Les produits suivants peuvent être associés à une thrombopénie sauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Alcool B. Aspirine C. Sulfamidés D. Héparine E. Méthotrexate 	<p>يمكن ان تترافق المواد الكيميائية التالية مع حدوث نقص الصفائح الدموية ما عدا :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. الكحول B. اسبرين C. سيلفاميدات D. هيبارين E. ميتوتريكسات

149	<p>Type 2 diabetes patients should be screened for diabetic nephropathy during which of the following examinations:</p> <ol style="list-style-type: none"> At initial diagnosis At one year after diagnosis At five years after diagnosis At 10 years after diagnosis <p>Des patients ayant un diabète de type 2 doivent être dépistés pour une néphropathie diabétique durant lequel des examens suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> Au diagnostic initial Un an après le diagnostic 5 ans après le diagnostic 10 ans après le diagnostic 	<p>من خلال أي من الاختبارات التالية يجب التحري عن اعتلال كلوي سكري عند مريض سكري نمط II ؟</p> <p>A. عند التشخيص البدئي</p> <p>B. بعد مرور سنة على التشخيص</p> <p>C. بعد مرور خمس سنوات على التشخيص</p> <p>D. بعد مرور عشر سنوات على التشخيص</p>
150	<p>In which of the following conditions is pleurocentesis urgent?</p> <p>A-A giant lobar emphysema B-A cystic adenomatoid malformation of the lung C-A right diaphragmatic hernia D-A left diaphragmatic hernia E-A tension pneumothorax</p> <p>Dans laquelle des pathologies suivantes, la ponction pleurale est urgente ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Un emphysème lobaire géant Une malformation adénomatoïde kystique du poumon Une hernie diaphragmatique droite Une hernie diaphragmatique gauche Un pneumothorax suffocant 	<p>في أي من الحالات التالية، ضروري اجراء بذل جنبي ؟</p> <p>A. نفاخ فصي عملاق B. سوء تشكيل ورم غدي كيسى في الرئة C. فتق حجابي حاجزى أيمين D. فتق حجابي حاجزى أيسر E. استرواح الصدر الضاغط</p>
151	<p>Which of the following manifestations is not encountered in systemic rheumatoid disease?</p> <p>A. Pericarditis B. Amyloidosis C. Pancreatitis D. Vasculitis E. Carpal tunnel syndrome</p> <p>Quelle est parmi les manifestations suivantes celle qu'on ne trouve pas dans la maladie rhumatoïde systémique ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Pericardite Amyloidose Pancreatite Vasculite Syndrome du canal carpien 	<p>أي من المظاهر التالية ليس لها علاقة بالداء الرثيوي الجهازي ؟</p> <p>A. التهاب التامور B. الداء النشواني C. التهاب البنكرياس D. التهاب وعائي E. متلازمة النفق الرسغي</p>

152	<p>A 24-year-old pregnant woman in her last trimester sustained an ankle sprain. She reports severe pain, 8/10. She was able to walk 10 steps, had minimal swelling over the medial aspect of the ankle with no local tenderness. You advised rest, ice application and elevation. Which of the below will help the pain?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Paracetamol B. Non steroidal anti inflammatory drug C. Paracetamol and an opioid D. Functional physiotherapy <p>Une femme enceinte âgée de 24 ans dans son dernier trimestre de grossesse subit une entorse de la cheville. Elle rapporte une douleur sévère de grade 8/10. elle était capable de marcher 10 pas, elle a un gonflement minime au niveau de la partie interne de la cheville sans douleur localisée. Vous lui conseillez un repos au lit, une application de glace et surélévation du membre. Quel est parmi les suivants celui qui va aider à calmer la douleur ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Paracetamol B. Anti-inflammatoire non stéroïdien C. Paracetamol et opiacé D. Physiothérapie fonctionnelle 	<p>امرأة حامل، عمرها 24 عاماً، في الفصل الأخير من الحمل تعاني من إلتواء كاحل. تبين أنها تشكو من الألم الشديد، 8/10. استطاعت أن تمشي 10 خطوات ولديها ورم خفيف فوق المنطقة الوسطى من الكاحل من دون أيام موضعية. نصحتها بالراحة، وضع الثلج ورفعها. أي من التالي يمكن أن يساعد المريضة؟</p> <p>A. باراسيتامول B. مضاد التهاب غير سteroidiC. باراسيتامول ومركب افيونيD. علاج فیزیائی</p>
153	<p>Which of the following medications has been shown to reduce mortality rates in patients with type II diabetes?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Exenatide B. Rosiglitazone (Avandia) C. Sitaglipin(Januvia) D. Metformin(Glucophage) E. Sulfonylurea <p>Quelle est parmi les médicaments suivants celui qu'on a démontré qu'il réduit le taux de mortalité chez les patients ayant un diabète de type II ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Exenatide B. Rosiglitazone (Avandia) C. Sitaglipine(Januvia) D. Metformine(Glucophage) E. Sulfonyluree 	<p>أي من الأدوية التالية تبين أنه يخفض من معدل الوفيات عند مرضى يعانون من داء سكري نمط II ؟</p> <p>A. إكزيناتيد B. روز غلิตازون C. سيتاغلیپین D. متفورمین E. سلفونیل یوریزا</p>

154	<p>The most consistent finding with testicular torsion is</p> <ul style="list-style-type: none"> A. "Bag of worms" consistency B. Transilluminates C. Elevation of testes may aggravate pain D. A normal cremasteric reflex E. Most torsions occur during the day <p>Le signe le plus important qu'on trouve en cas de torsion testiculaire est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Consistance comme un sac de vers B. Transillumination C. L'elevation du testicule peut agraver la douleur D. Un reflexe cremasterien normal E. La plupart des torsions se produisent durant le jour 	<p>ان العرض الأكثر تلاؤماً مع اللوي الخصيوي هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. قوام "كيس الديدان" B. التفود الضوئي C. رفع الخصية يمكن ان يزيد الألم D. منعكس طبيعي للمشمرة E. اكثر الالتواءات تحدث خلال النهار
155	<p>Which of the following will be associated with an increased reticulocyte count at the time of initial evaluation of macrocytosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Vitamin B12 deficiency B. Hemolysis C. Folate deficiency D. Hypothyroidism <p>Quelle est parmi les suivantes celle qui est associee a une augmentation du compte des reticulocytes au moment de l'évaluation initiale d'une macrocitose ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Deficit en vitamine B12 B. Hemolyse C. Deficit en folate D. Hypothyroidisme 	<p>اي من التالي يترافق مع ارتفاع في عدد الشبكيات عند التقييم الأولي لكبر الكريات ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> A. عوز فيتامين B12 B. انحلال الدم C. عوز الفولات D. نقص نشاط الدرق

156	<p>An 85 year-old-woman who has breast cancer with bone metastasis has intractable pain. Which one of the following statements about radiation therapy is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bone pain from metastatic cancer can be improved with radiation therapy. B. It has no role in her treatment because the cancer has spread. C. If she receives radiation therapy, she would have to limit her social contacts after her treatment. D. It is likely to cause secondary tumors and should be avoided. <p>Une femme âgée de 85 ans, qui a un cancer du sein avec métastases osseuses, a une douleur rebelle au traitement. Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui est correcte concernant la radiothérapie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La douleur osseuse, provenant du cancer métastatique, peut être améliorée par la radiothérapie B. Il n'a aucun rôle dans le traitement car le cancer est disséminé C. Si elle reçoit la radiothérapie, elle doit limiter ses contacts sociaux après le traitement D. Il va causer probablement des tumeurs secondaires et doit être évité 	<p>امرأة عمرها ٨٥ عاماً تعاني من سرطان ثدي مع نقلة عظمية ولديها ألم عسير. أي من العبارات التالية عن العلاج الشعاعي صحيحة؟</p> <p>أ. ألم العظام الناتج عن السرطان النقيلي يمكن أن يتحسن بالعلاج الشعاعي</p> <p>ب. ليس لديه دور في علاجها لأن السرطان قد انتشر</p> <p>ج. إذا تلقت علاج شعاعي، يجب أن تحد من علاقاتها الاجتماعية بعد العلاج</p> <p>د. يمكن أن يسبب أورام ثانوية على الأرجح، ويجب تجنبه</p>
157	<p>The most common cause of hemoptysis in children is</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lower respiratory tract infection B. Foreign body aspiration C. Tuberculosis D. Bronchiectasis <p>La cause la plus fréquente de l'hémoptysie chez les enfants est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Une infection des voies respiratoires basses B. Une aspiration d'un corps étranger C. Tuberculose D. Bronchiectasie 	<p>ان السبب الشائع لحدوث نفث الدم عند الأطفال هو :</p> <p>أ. انتان الجهاز التنفسى السقلي</p> <p>ب. شفط جسم غريب</p> <p>ج. داء السل</p> <p>د. توسيع القصبات</p>
158	<p>The most common organism that causes epididymitis in patients age between 14 years and 35 years is</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chlamydia trachomatis B. Klebsiella pneumonia C. Escherichia coli D. Ureaplasma urealyticum <p>L'organisme le plus fréquent qui cause une épididymite chez un patient âgé entre 14 et 35 ans est</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chlamydia trachomatis B. Klebsiella pneumonia C. Escherichia coli D. Ureaplasma urealyticum 	<p>ان العامل الممرض الأكثر شيوعاً للإصابة بالتهاب البربخ عند مرضى يبلغ عمرهم بين ١٤ و ٣٥ عاماً هو :</p> <p>أ. المنشرات الحثرية</p> <p>ب. الكلبيسللا الرئوية</p> <p>ج. الأيشريكيات القولونية</p> <p>د. الميورة الحالة لليوريا</p>

162	<p>Hypothermia can occur in:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. hyperglycemia B. hypoglycemia C. hyperaldosteronism D. pheochromocytoma E. acromegaly <p>L'hypothermie peut survenir dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Hyperglycémie B. Hypoglycémie C. Hyperaldostéronisme D. Phéochromocytome E. Acromégalie 	<p>انخفاض درجة الحرارة يمكن أن يحصل في :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. فرط سكر الدم B. نقص سكر الدم C. فرط الدوستيرونية D. ورم القوائم E. العملاقة
163	<p>A 65 year-old man presents because of worsening dyspnea. He is a smoker and has a chronic productive cough. Physical examination shows a BP of 125/70 with 20 mm Hg of systolic decrease with inspiration. Pulse is 100/mm and regular. The chest is hyperinflated and breath sounds are diminished. Heart sounds are distant and there is no rub. What is the most likely diagnosis?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Right ventricular infarction B. Chronic obstructive lung disease C. Acute pulmonary embolism D. Pericardial tamponade E. Broncho-pneumonia <p>Un homme age de 65 ans se presente a cause d'une aggravation de sa dyspnee. Il est tabagique et a une toux chronique productive. L'examen physique montre une tension arterielle a 125/70 avec une diminution systolique de 20mmHg avec l'inspiration. Le pouls est a 100/mm et regulier. Le thorax est hyperenfle et les murmurs vesiculaires sont diminues. Les bruits du cœur sont distants et il n'y a pas de friction. Quel est le diagnostic le plus probable ?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Infarctus du ventricule droit B. Maladie pulmonaire obstructive chronique C. Embolie pulmonaire aigue D. Tamponade pericardique E. Bronchopneumonie 	<p>رجل عمره ٦٥ عاماً يشكو من ضيق نفس. هو مدخن ولديه سعال مزمن مصحوب بقشع. اظهر الفحص السريري ان ضغط الدم ١٢٥/٧٠ مع ٢٠ مم زئبق انخفاض إنقباضي عند الشهيق. النبض ١٠٠ /د وطبيعي. الصدر متتفجخ وأصوات النفس تكاد تكون غائبة. اصوات القلب بعيدة ولا يوجد احتكاك. ما هو التشخيص الأكثر ترجيحاً :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. احتشاء بطيني أيمن B. داء الرئة الانسدادي C. انصمام رئوي حاد D. انداخس تاموري E. ذات رئة قصبي
164	<p>The scabies mite is predominantly transmitted by</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Bed linen B- Personal contact C- Hats D- Pets <p>La gale est transmise par</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Les draps du lits B- Le contact personnel C- Les chapeaux D- Les animaux domestiques 	<p>تنقل غالباً عنده الجرب بما يلي</p> <ul style="list-style-type: none"> A- شرائف الفراش B- اتصال شخصي C- القبعات D- الحيوانات الأليفة

165	<p>A 36-year-old gravida 1 para 1 presents with pain and bleeding due to a large uterine fibroid confirmed by examination and pelvic ultrasonography. The patient requests treatment but wants to preserve her fertility. Which one of the following is the best treatment</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Oral contraceptives B- Uterine artery embolization C- Metformin D- Myomectomy <p>Une femme primipare présente des douleurs et saignements secondaires à un fibrome utérin diagnostique par examen physique et échographie pelvienne. Le patient demande un traitement mais veut préserver sa fertilité</p> <p>Lequel des traitements suivants est le meilleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Contraceptifs oraux B- Embolisation de l'artère utérine C- Metformine D- Myomectomie 	<p>امرأة عمرها ٣٦ عاماً رقم الولادة عندها (1) والحمل (1) تشكّر من الم وتنزف بسبب تليّف واسع للرحم ثبتّ بتصوير الحوض بما فوق الصوت. تطلّب أن تعالج على شرط أن تحافظ على خصوبتها. أي مما يلي هو أفضل علاج</p> <ul style="list-style-type: none"> - مضادات الحمل الفموية - إيجاد صمام للشريان الرحمي - متفورمين - استئصال الورم العضلي الرحمي
166	<p>Ocular lesion that should be looked up in toxoplasmosis is:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Chorioretinitis B. Anterior uveitis C. Keratoconjunctivitis D. Hypopion E. Optic neuritis <p>L'atteinte oculaire qui devrait faire rechercher une toxoplasmose est</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La chorio rétinite B. L'uvéite antérieure C. La Kerato conjonctivite D. L'hypopion E. La nevrite optique 	<p>اصابة العين التي تتطلب البحث عن داء السهوميات :</p> <ul style="list-style-type: none"> .A. التهاب المشيمية والشبكيّة .B. التهاب العتبة الإمامية .C. التهاب القرنية والمنضمة .D. تجمع قيحي في الحجرة الإمامية للعين .E. التهاب العصب البصري
167	<p>Lymphadenopathy of the head and neck at which one of the following sites is most likely to be malignant</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Anterior cervical B. Posterior cervical C. Preauricular D. Submandibular E. Supraclavicular <p>Laquelle des topographies suivantes, concernant une lymphadenopathie cervicale, est plus probablement maligne</p> <ul style="list-style-type: none"> A-Antérieure B-Postérieure C-Preauriculaire D-Sous mandibulaire E-Supraclaviculaire 	<p>في اعتلال العقد المفاوئية للرأس والعنق أي واحد مما يلي يشير مكانه إلى الخبيثة</p> <ul style="list-style-type: none"> -A العنق الأمامي -B العنق الخلفي -C حول الأذن -D تحت الفك السفلي -E فوق الترقوه

168	<p>The recommended time to screen asymptomatic pregnant women without risk factors for gestational diabetes is</p> <ul style="list-style-type: none"> A- In the first trimester B- At 16-20 weeks gestation C- At 24-28 weeks gestation D- At 35- 37 weeks gestation <p>La période prévue pour un screening de diabète gestationnel chez une femme n'ayant pas de facteurs de risque est :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Durant le premier trimestre B- Entre 16-20 semaines C- Entre 24-28 semaines D- Entre 35-37 semaines 	<p>افضل وقت للمعاينة الدرئية لحامل دون اعراض ودون عوامل خطر للداء السكري الحملي</p> <p>- في الالتوث الأول</p> <p>A- بعد ١٦ - ٢٠ اسبوعاً من الحمل</p> <p>B- بعد ٢٤ - ٢٨ اسبوعاً من الحمل</p> <p>C- بعد ٣٥ - ٣٧ اسبوعاً من الحمل</p>
169	<p>You see a healthy 7 year old male who was bitten on the cheek one hour ago by the neighbor's dog. On examination you find a jagged laceration about 2 cm long that extends into the fatty tissue. Which one of the following would be appropriate in the management of this injury</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Copiously irrigate the wound with normal saline and suture B- Allow healing by secondary intention C- culture the wound before suturing D- Give metronidazole (Flagyl) prophylactically F- Have the animal killed and the brain tissue analyzed. <p>Un enfant de 7ans est mordu sur la face par le chien du voisin. A l'examen, la plaie est étendue sur 2 cm et profonde atteignant le tissu Graisseux. Laquelle des propositions suivantes est la plus appropriée pour ce malade :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Irrigation copieuse de la plaie par du sale et suture B- Permettre une cicatrisation ultérieure C- Culture de la plaie avant de suturer D- Donner prophylactique ment du Metronidazole E- Tuer l'animal et analyser le tissu cérébral 	<p>طفل عمره ٧ سنوات عضه كلب الجيران في خده منذ ساعة بالمعاينة تبين ان مزق العضة المفترض بطول ٢ سنتيمتر وممتد الى النسيج الشحمي أي مما يلي هو الأفضل لهذا الجرح</p> <p>A- غسل الجرح بكمية وافرة من السائل الملحي النظامي ثم الخياطة</p> <p>B- يترك الجرح ليلتئم بالقصد الثاني</p> <p>C- الزرع من الجرح قبل خياطته</p> <p>D- اعطاء مترونيدازول (فلاجي) وقاية</p> <p>E- يقتل الكلب ويرسل دماغه للفحص والتحليل</p>

170	<p>The mother of a toddler presents to your office. She is concerned that immunization for pertussis and measles may predispose to asthma and other atopic illness. Which one of the following would be appropriate advice</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Pertussis and measles immunizations should be withheld in children with a strong family history of asthma B- Because of the association between pertussis vaccine and atopic disease, an antihistamine should be administered before giving pertussis vaccine C- there is no conclusive evidence that pertussis or measles immunization carries any risk of increased atopic disease D-Measles vaccine should not be administered to any child with a history of urticaria <p>La mère d'un nouveau né est inquiète car elle a lu que l'immunisation contre la coqueluche et la rougeole prédispose à l'asthme et à d'autres maladies atopiques. Laquelle des propositions suivantes serait l'avis approprié</p> <ul style="list-style-type: none"> A-L'immunisation contre la rougeole et la coqueluche ne devraient pas être administrer si présence d'une histoire familiale d'asthme B- Un anti histaminique devrait être administre avant le vaccin contre la coqueluche C- Il n'y a pas d'évidence que l'immunisation contre la coqueluche ou la rougeole porte un risque de maladie allergique D- Le vaccin anti rougeole ne devrait pas être administre chez un enfant ayant une histoire d'urticaire 	<p>والدة طفل صغير راجعتك وهي عالمة ان التحصين ضد السعال الديكي (الشاهوقي) والحسبة قد يعرضان للإصابة بالربو وغيره من الأمراض التأببية. باى مما يلى تتصحها</p> <p>A- التحصين ضد السعال الديكي والحسبة لا يجرى للأطفال المترددين من عائلة في سيرتها الربو</p> <p>B- وبسبب هذا الاشتراك بين لقاح الشاهوقي والامراض ذات الاستعداد الوراثي يجب اعطاء مضاد الهستامين قبل اعطاء لقاح الشاهوقي</p> <p>C-ليس من تأكيد بان التحصين ضد الشاهوقي والحسبة يسبب اي خطر لازدياد مرض ذي استعداد وراثي</p> <p>D-لقاح الحصبة يجب ان لا يعطى للطفل في سيرته "شري"</p>
-----	---	---

171	<p>A patient with known gallstones presents with right upper quadrant pain, fever, jaundice and shaking chills. He is febrile. Cholangitis is suspected. Which statement concerning cholangitis is correct?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. The most common infecting organism is <i>Staphylococcus aureus</i> B. The diagnosis is suggested by the Charcot triad C. The disease occurs primarily in young, immunocompromised patients D. Cholecystostomy is the procedure of choice in affected patients E. Surgery is indicated once the diagnosis of cholangitis is made <p>Un patient connu ayant des calculs vésiculaires présente une douleur du quadrant supérieur abdominal droit avec fièvre, jaunisse et frissons. Il est suspect d'une cholangite. Laquelle des propositions suivantes concernant la cholangite est vraie</p> <ul style="list-style-type: none"> A. L'organisme le plus fréquent est le staphylocoque dore B. Le diagnostic est suspecté par la triade de Charcot C. La maladie survient surtout chez les jeunes immunodéprimés D. La cholecystectomie est la procédure de choix chez les malades affectés E. La chirurgie est indiquée dès que le diagnostic de cholangite est posé 	<p>مصاب ب حصيات صفراوية وألم في المربع العلوي الأيمن وحمى وبرقان وارتعاش. يشتبه بالتهاب الأقنية الصفراوية. أي مما يلي بخصوص التهاب الأقنية الصفراوية هو الصحيح</p> <p>a- العضويات المسيبة عادة لالتهاب هي العنقرديات المذهبة</p> <p>b- يقترح التشخيص استناداً إلى ثلاثة شاركو</p> <p>c- يحدث المرض عادة عند الشباب ذوي المناعة المشكوك بأمرها</p> <p>d- بعض المراة هي الطريقة المفضلة عند المرضى المتأثرين بالحالة</p> <p>e- يوصى بالجراحة حين وضع تشخيص التهاب الأقنية الصفراوية</p>
-----	---	---

172	<p>A 45-year-old executive experiences increasingly painful retrosternal heartburn, especially at night. He has been chewing antacid tablets, an esophagogram shows a hiatal hernia. In determining the proper treatment for a sliding hiatal hernia, the most useful step is</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Barium swallow with cinefluoroscopy during Valsalva maneuver B. Flexible endoscopy C. 24-h monitoring of esophageal PH D. Measuring the size of the hernia E. Assessing the patient's smoking and drinking history 	<p>مريض عمره ٤٥ عاماً شعر بألم شديد خلف عظم القص وبشكل حرقة خاصة أثناء الليل. كان يمضغ أقراصاً ضد الحموضة وأبدى مخطط المري فتق الفوهه ولتحديد المعالجة الملائمة لانزلاق الفتق والأكثر فائدة</p> <ul style="list-style-type: none"> a- ازدراد الباريوم مع التقطير التالقي أثناء مناوره فالسليفا b- تقطير باطني من c-مراقبة رمز الحموضة PH في المري خلال ٢٤ ساعة d-قياس حجم الفتق e-تحديد التدخين والكحول عند المصاب
	<p>Un directeur age de 45 ans sent une douleur retrosternale à type de brûlure qui est en train d'augmenter surtout la nuit. Il prend des tablettes d'antacides. Un oesophagogramme montre une hernie hiatale. Pour determiner le traitement approprie d'une hernie hiatale par glissement, le mieux est de faire:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Un repas baryte avec cinefluoroscopie durant une manœuvre de Valsalva B. Fibroscopie C. Monitoring du PH oesophagien pendant 24 heures D. Mesurer la taille de la hernie E. Evaluation de l'histoire d'alcoolisme et de tabagisme 	

173	<p>Un enfant de 7 ans présente depuis 3 jours une douleur à la gorge, dysphonie et une fièvre de 38°C et une toux. Son examen révèle des amygdales injectées sans exsudats ou anomalies du murmure vésiculaire Laquelle, des propositions suivantes, serait la plus appropriée :</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Recommander un traitement symptomatique B- Faire un test rapide pour l'antigène streptococcique C- Traiter empiriquement pour une pharyngite streptococcique D- Faire une culture de gorge pour streptocoque E- Faire un test pour la mononucléose 	<p> طفل ذلك عمره ٧ سنوات راجع لبحث صوت خشن منذ ٣ أيام مع حمى ٣٨ سنتغراد وسعال. بالمعاينة تبين احتقان اللوزتين دون نتحات ودون شذوذ بالاصوات التنفسية أي مما يلي هو المفضل لهذه الحالة</p> <ul style="list-style-type: none"> -A- توصية بمعالجة عرضية -B- اجراء سريعا اختبار لالتهاب البلعوم بالملкорات العقدية -C- معالجة اختبارية لالتهاب البلعوم بالعقديات -D- اجراء زرع من الحلق لالتهاب البلعوم بالعقديات -E- اجراء اختبار لداء وحيدات النواة <p>A 7-year-old male presents with a 3-day history of sore throat, hoarseness, fever of 38°C and cough. Examination reveals injection of his tonsils, no exudates, and no abnormal breath sounds. Which one of the following would be most appropriate</p> <ul style="list-style-type: none"> A- Recommend symptomatic treatment B- Perform a rapid antigen test for streptococcal pharyngitis C- Treat empirically for streptococcal pharyngitis D- Perform a throat culture for streptococcal pharyngitis E- Perform test for mononucleosis
174	<p>A 21 year old woman presents with a 6 cm non-tender mass located in the center of her neck. On physical examination the thyroid gland is normal in size and there are no bruits audible over the mass. She has no other symptoms or complaints. She does not smoke or drink alcohol. Which of the following is the most likely diagnosis</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Branchial cleft cyst B. Thyroglossal ductal cyst C. Lipoma D. Carotid body tumor E. Laryngocele <p>Une femme âgée de 21 ans se présente avec une masse indolore de 6 cm localisée au centre du cou. A l'examen physique la glande thyroïde est normale en taille et il n'y a pas de souffle audible au niveau de la masse. Elle n'a pas d'autres symptômes ou plaintes. Elle ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Quel est parmi les suivants le diagnostic le plus probable</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Kyste branchial B. Kyste du canal thyreoglosse C. Lipome D. Tumeur du corps de la carotide E. Laryngocele 	<p>امرأة عمرها ٢١ عاما رجعت لكتلة غير مؤلمة ٦ سم موضعية في منتصف العنق. تبين بالمعاينة ان الغدة الدرقية طبيعية بحجمها ولا توجد نفخة مسموعة بمستوى الكتلة ليس لديها اعراض او شكليات أخرى. لا تدخن ولا تشرب الكحول.</p> <p>اي مما يلي التشخيص الأكثر ترجيحا</p> <ul style="list-style-type: none"> A. كيس غلصمي B. كيس القناة الدرقية اللسانية C. ورم شحمي D. ورم الجسم السباتي E. قيلة حنجرية

175	<p>A 19 year old girl presents with the chief complaint of bloody diarrhea for 2 months. She has abdominal discomfort and feels she has lost some weight. She also complains of tenesmus. Abdominal examination is normal. Rectal exam reveals stool containing blood and pus. Which of the following is the most likely diagnosis</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Irritable bowel syndrome B. Ulcerative colitis C. Giardiasis D. Hemorrhoids E. Diverticulosis <p>Une fille âgée de 19 ans se présente pour une plainte majeure de diarrhée sanguinolente depuis 2 mois. Elle a une gêne abdominale et sent qu'elle a perdu du poids. Elle se plaint aussi de ténèse. L'examen abdominal est normal le toucher rectal révèle des selles contenant du sang et du pus. Quel est parmi les suivants le diagnostic le plus probable</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Syndrome du colon irritable B. Colite ulcéreuse C. Giardiase D. Hémorroïdes E. Diverticulose 	<p>شابة عمرها ١٩ عاماً تشكى من اسهال مدمى منذ شهرين. متزوجة من بطنها وتناقص وزنها وتتشko ايضاً من زحير. معانقة البطن طبيعية واظهر المس الشرجي غائطاً فيه دم وقيح. اي مما يلي التشخيص المرجو</p> <ul style="list-style-type: none"> A. متلازمة القولون الهبيوج B. التهاب القولون التقرحي C. الجيارديا D. بواسير E. داء الرتنيج
176	<p>A 71 year old man presents to your office with the chief complaint of a 20 kg weight loss over the last 4 months. He has anorexia and generalized weakness. Abdominal examination is positive for a scaphoid abdomen and a palpable nodule found in the area of the umbilicus. The nodule is irregular and appears to replace part of the umbilicus. Which of the following is the most likely cause of the physical examination findings</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pancreatic cancer B. Esophageal cancer C. Hepatocellular cancer D. Renal cell carcinoma E. Hodgkin's lymphoma <p>Un homme âgé de 71 ans se présente dans votre clinique se plaignant d'une perte de poids de 20 kg. Durant les 4 derniers mois. Il a une anorexie et une faiblesse généralisée. L'examen abdominal révèle un abdomen scaphoïde et un nodule palpable au niveau de la région ombilicale. Le nodule est irrégulier et remplace en partie l'ombilic. Quelle est parmi les suivantes la cause la plus probable de ses découvertes à l'examen physique</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Cancer du pancréas B. Cancer de l'œsophage C. Cancer hépatocellulaire D. Carcinome rénal E. Lymphome de Hodgkin 	<p>رجل عمره ٧١ عاماً راجعك لفقدان ٢٠ كغ من وزنه. في الاشهر الاربعة الاخيرة اصيب بقهم وضعف عام. ابدى فحص البطن عقيدة محسوسة مستوى السرة والعقدة غير منتظمة وتحل محل قسم من السرة. اي مما يلي السبب الاكثر ترجيحاً لهذه الاكتشافات بالمعانينة الجسدية</p> <ul style="list-style-type: none"> A. سرطان البنكرياس B. سرطان المري C. سرطان الخلايا الكبدية D. سرطانة كلوية E. ورم لمفي هودجkin

177	<p>A 71 year old man complains of occasional lower back pain. His blood pressure is 150/85 mmHg and his pulse is 80/min. cardiac examination reveals an S4 gallop. Abdominal examination reveals a pulsatile mass approximately 5.0 cm in diameter palpable in the epigastric area. Peripheral pulses are normal. Which of the following is the most likely diagnosis</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Abdominal aortic aneurysm B. Cancer of the proximal colon C. Peptic ulcer disease D. Chronic pancreatitis E. Lipoma of the abdominal wall <p>Un homme âgé de 71 ans se plaint d'une douleur occasionnelle basse du dos. Sa tension artérielle est à 150/85 mm Hg et son pouls est à 80/min. l'examen cardiaque révèle un galop S4. l'examen de l'abdomen révèle une masse pulsatile approximativement de 5 cm de diamètre, palpable dans la région épigastrique. Les pouls périphériques sont normaux. Quel est parmi les suivants le diagnostic le plus probable</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Anévrisme de l'aorte abdominale B. Cancer du colon proximal C. Ulcère peptique D. Pancréatite chronique E. Lipome de la paroi abdominale 	<p>رجل عمره ٧١ عاما يشكو أحيانا من الم اسفل الظهر. الضغط الشرياني ١٥٠/٨٥ ملم زئبق والنبض/٨٠ دققة. ابدي فحص القلب صوت خبب S4 وابدى فحص البطن كتلة نابضة قطرها ٥ سم تقريبا ومحسوسة في ناحية الشرسوف. النبض المحيطي طبيعي. مما يلي ما هو التشخيص المرجح</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ام دم الابهر البطني B. سرطان القولون الداني C. قرحة هضمية D. التهاب البنكرياس المزمن E. ورم دهني لجدار البطن
178	<p>If you find a negative result of one sputum smear, in a suspected TB (Tuberculosis) patient, that means :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. He is not diseased B. You should perform a culture of his sputum C. You should repeat the sputum smear D. None of the above <p>Si chez un patient suspect d'avoir une tuberculose, vous trouvez un résultat négatif sur l'examen direct d'un crachat, cela veut dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Il n'est pas atteint B. Vous devez faire une culture des crachats C. Vous devez répéter l'examen des crachats D. Aucun des précédents 	<p>إذا وجدت نتيجة سلبية للطاخة قشع واحدة عند مريض يعتقد انه مصاب بداء السل، هذا يعني :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. هو ليس مصاب بالداء B. يجب اجراء زرع للفشع C. يجب اعادة اجراء نطاخة القشع D. كل الأجوبة اعلاه غير صحيحة
179	<p>Positive tuberculin test means :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. The patient is infected B. The patient is diseased C. The patient is infected and diseased D. None of the above <p>Un test de tuberculine positif veut dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Le patient est infecté B. Le patient est atteint par la maladie C. Le patient est infecté et atteint par la maladie D. Aucun des précédents 	<p>إن اختبار السيلين الإيجابي يعني :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ان المريض مصاب بالإلانتان B. ان المريض مصاب بالداء C. ان المريض مصاب بالإلانتان والداء D. كل الأجوبة اعلاه غير صحيحة

180	<p>You have to suspect TB(Tuberculosis) if one of the following is present :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Persistent cough for more than 4 weeks B. Significant weight loss C. Night sweats D. All of the above <p>Vous avez à suspectez une tuberculose. Si vous trouvez l'un des suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Toux persistante pour plus de 4 semaines B. Perte de poids significative C. Sueurs D. Tout ce qui précède 	<p>يجب ان تتوقع الإصابة بداء السل إذا وجدت احدى الظواهر التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. سعال دائم لأكثر من ٤ أسابيع B. فقدان وزن بارز C. تعرق ليلي D. كل الأربوأة أعلاه صحيحة
-----	--	---

**REPUBLIQUE LIBANAISE
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

Date : 03/12/11
Page : 1

Liste des Réponses Justes Serie B

Du colloquium MEDECINE

Pour la 2ème session 2011

| Quest Rep |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 C | 37 B | 73 B | 109 C | 145 A |
| 2 A | 38 C | 74 C | 110 C | 146 C |
| 3 A | 39 B | 75 E | 111 C | 147 C |
| 4 A | 40 B | 76 B | 112 E | 148 B |
| 5 A | 41 B | 77 A | 113 E | 149 A |
| 6 C | 42 D | 78 A | 114 E | 150 E |
| 7 B | 43 D | 79 E | 115 E | 151 C |
| 8 C | 44 C | 80 C | 116 A | 152 A |
| 9 C | 45 C | 81 D | 117 A | 153 D |
| 10 B | 46 C | 82 B | 118 D | 154 C |
| 11 C | 47 A | 83 B | 119 B | 155 B |
| 12 D | 48 B | 84 D | 120 C | 156 A |
| 13 C | 49 E | 85 C | 121 A | 157 A |
| 14 C | 50 B | 86 B | 122 D | 158 A |
| 15 D | 51 A | 87 B | 123 D | 159 C |
| 16 C | 52 D | 88 A | 124 C | 160 D |
| 17 A | 53 A | 89 B | 125 A | 161 B |
| 18 B | 54 B | 90 A | 126 B | 162 B |
| 19 D | 55 B | 91 D | 127 E | 163 D |
| 20 B | 56 E | 92 B | 128 D | 164 B |
| 21 B | 57 D | 93 B | 129 B | 165 D |
| 22 D | 58 C | 94 A | 130 B | 166 A |
| 23 D | 59 C | 95 C | 131 C | 167 E |
| 24 D | 60 C | 96 D | 132 C | 168 C |
| 25 D | 61 B | 97 C | 133 D | 169 A |
| 26 A | 62 D | 98 D | 134 C | 170 C |
| 27 B | 63 B | 99 C | 135 B | 171 B |
| 28 C | 64 C | 100 E | 136 C | 172 B |
| 29 D | 65 A | 101 D | 137 B | 173 A |
| 30 A | 66 C | 102 A | 138 E | 174 B |
| 31 D | 67 E | 103 A | 139 C | 175 B |
| 32 C | 68 D | 104 D | 140 A | 176 A |
| 33 C | 69 C | 105 B | 141 A | 177 A |
| 34 A | 70 C | 106 B | 142 D | 178 C |
| 35 B | 71 A | 107 B | 143 B | 179 A |
| 36 A | 72 C | 108 E | 144 C | 180 A |